

類

證

治

裁

類證治裁卷之二

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝蘭校

虛損勞瘵論治

經言精氣奪則虛。凡營虛衛虛。上損下損。不外精與氣而已。精氣內奪。則積虛成損。積損成勞。甚而爲瘵。乃精與氣虛憊之極也。素問論五勞。謂久視傷血。久臥傷氣。久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。金匱論五勞。謂肺勞損氣。心勞損神。脾勞損食。肝勞損血。腎勞損精。越人謂自上損下者。一損肺。勞嗽。二損心。盜汗。三損胃。減食。四損肝。鬱怒。五損腎。淋過。胃則不治。自下損上者。一損腎。遺濁。二損肝。脇痛。三損

脾○腹○四○損○心○驚悸五○損○肺○喘過○脾○則○不○治○誠○以○脾○胃○為○精○與○氣○生○

化○之○源○也○故○治○虛○勞○以○能○食○為○主○考○難○經○治○法○損○其○肺○者○益○其○氣○

保○元○損○其○心○者○調○其○營○衛○八珍湯損○其○脾○者○調○其○飲○食○適○其○寒○溫○四

湯○損○其○肝○者○緩○其○中○牛膝損○其○腎○者○益○其○精○金剛丸此○固○治○損○之○

要○矣○尤○必○先○辨○其○陽○虛○陰○虛○經○曰○陽○虛○生○外○寒○陰○虛○生○內○熱○凡○怯○

寒○少○氣○自○汗○喘○乏○食○減○無○味○嘔○脹○飧○泄○皆○陽○虛○症○也○此○脾○肺○虧○損○

由○憂○思○鬱○結○營○衛○失○和○惟○四○君○保○元○建○中○養○營○歸○脾○諸○湯○宜○之○若○

怔○忡○盜○汗○欬○血○吐○衄○淋○遺○崩○漏○經○閉○骨○蒸○皆○陰○虛○症○也○此○心○肝○腎○

虧○損○由○君○相○火○炎○精○髓○枯○竭○惟○補○心○三○才○六○味○大○造○固○本○諸○湯○宜○

之○又○若○腎○中○真○陽○虛○者○右尺宜○甘○溫○益○火○之○品○補○陽○以○配○陰○八味

必弱

或景岳右歸飲所謂益火之源以消陰翳也腎中真陰虛者左尺細數

宜純甘補水之品滋陰以配陽六味丸加或景岳左歸飲所謂壯

水之主以鎮陽光也陽虛不復久則吸短偏卧脉弱陽痿宜參朮

子山藥胡桃龍眼蓮棗沙苑子骨陰虛不復久則咽瘡音啞色悴

脂人乳鹿茸鹿膠羊肉羊腎海參肌羸宜麥味杏貝熟地首烏菟蓉燕窩烏雞而勞瘵成矣由是火

炎於上為嗽血宜五為潮熱宜清火動於下為遺濁宜龍為泄瀉

宜三白廣生湯而治療難矣夫水為萬物之元孫真人所以云補脾不若

補腎土為萬物之母許學士所以云補腎不若補脾然喜燥者脾

喜涼者腎欲補腎易傷脾欲補脾易傷腎不知土為金母金為水

母勞瘵至陽虛泄瀉宜溫以補脾然補脾須不礙肺勞瘵至陰虛

嗽熱宜潤以滋腎。然滋腎須不妨脾。補脾佐以五味。杞子不得偏

用辛溫以助火。桂附之屬亦不得偏用苦寒以戕胃。知藥之屬且虛勞以受

補為可治。不受補為不治。如用人參之甘溫。則大熱可除。乃陽生

陰長之理。所謂血脫者益氣。而葛可久治。勞十方用參者七也。故

曰土旺而金生。勿拘拘於保肺水。壯而火熄。毋汲汲於清心。

夫五勞者。勞傷五臟。乃虛損之源。而六極七傷。又虛損之流。極勞

療之深根也。如皮毛枯槁為肺勞。人參黃耆散血脉不榮為心勞。大五

食少肌消為脾勞。橘皮煎血虛筋緩為肝勞。黑腹腫足弱為腎勞腎

六極者。數轉筋。指甲痛為筋極。滋補養營丸牙疼踵痛不耐久

立為骨極。苳珠丸面色無華。頭髮墮落為血極。補營湯膚如蟲行。體肉

乾黑爲肉極。參苓丸。肌無膏澤。目無精光。羸瘦肌癢。搔則爲瘡。爲精

極。巴戟丸。胸脇逆滿。吸短難言。爲氣極。益氣丸。七傷者。一陰寒。二陰痿。

三裏急。四精漏。五精少。六精清。七溺數。併宜鎖陽丹。九龍丹。

凡虛損症。多起於脾胃。勞瘵症。多起於腎經。虛損潮熱。多起於內

傷。勞瘵陰虛火動。多起於傷風似瘡。虛損蒸蒸發熱。按至皮膚間

甚熱。不能食。不覺瘦。脉豁大。重按無力。勞瘵骨蒸。按之皮膚不熱。

按至筋骨。乃熱。能食而瘦。脉弦數。虛損轉潮熱泄瀉。脉短數者。不

治。勞瘵轉陰虛火動。喉痛脉細數者。死。虛症頰赤。或唇紅。陰虛逼

陽於上也。音瘖。腎氣竭也。欬而喘急。肺虛氣不歸腎也。喉乾咽痛。

真水涸。虛火炎也。不眠恍惚。血不養心神。不能藏也。時多煩躁。陽

中無陰柔不濟剛也。飲食不甘。肌肉漸消。脾元敗也。盜汗不止。有火則陰不能攝。無火則陽不能固也。骨痛如折。腎主骨。真陰竭也。筋急痠痛。水虧木燥。肝失養也。足心如烙。虛火燥陰。湧泉涸也。

虛損勞瘵脉候

脉大爲勞。脉虛亦爲勞。大而無力爲陽虛。數而無力爲陰虛。沈遲小爲脫氣。大而芤爲脫血。細微而小爲氣血俱虛。寸弱而軟爲上虛。尺弱而濇爲下虛。兩關沈細爲胃虛。弦爲中虛。凡細數弱濇弦皆勞傷脉。但漸緩則有生意。若弦甚者病必進。數甚者病必危。

附方

益氣

保元湯

見一卷火

緩肝益精益精補陽補陽補陰補陰滋血

牛膝丸

牛膝 草薢 兔絲餅

杜仲

防風

菴藟

桂心

茯苓

茯苓

金剛丸

杜仲

菴藟

兔絲餅

猪腰子酒煮為丸

煨腎丸

牛膝 草薢 胡盧巴

兔絲餅

杜仲

防風

菴藟

桂心

故紙

右歸飲

人參 白朮

山藥

杞子

熟地

杜仲

黃肉

炙草

右歸丸

前飲去朮草杞子

加鹿膠

兔絲餅

蜜丸

左歸飲

熟地

山藥

杞子

炙草

茯苓

山黃

左歸丸

前飲去茯苓炙草

加牛膝

兔絲餅

鹿膠

五汁膏

天冬 麥冬 茯苓

犀角

生地

薄荷

貝母

丹皮

阿膠

蔗汁

蘿蔔汁

蜜熬

清骨散

秦艽 胡黃連

鱉甲

知母

青蒿

地骨皮

銀柴胡

遺濁泄瀉肺勞 心勞脾勞 肝勞腎勞筋極

龍齒丸 人參 茯神 遠志 龍齒 菖蒲 知母 黃蘗

三白廣生湯 苓 朮 陳 草 芍 貝 地骨皮 棗仁

人參黃耆湯 鱉甲錢半 天冬一錢 秦朮 生地 柴胡

黃耆 赤芍 甘草各五分 人參 茯苓 桔梗各三分

大五補丸 麥冬 天冬 人參 熟地 益智子 枸杞子

橘皮煎 橘皮五兩 甘草三兩三錢 當歸 草薢 茯苓

鹿茸 杜仲 兔絲子 乾薑各一兩 酒半升 牛膝

沙鍋內入橘皮煎 再入諸藥末為丸 酒下

黑丸 當歸 鹿茸各一兩 烏梅肉為丸 酒下

腎氣丸 八味丸見一卷中風此再加 牛膝 車前

滋補養營丸 遠志 白芍 黃耆 白朮各兩半 熟地

人參 五味 芎 歸 山藥各二兩 陳皮

筋極骨極

八錢 茯苓七錢 生地五錢
山黃四錢 蜜丸

酒煮木瓜粥 大木瓜 水酒煮爛研膏裏轉筋處冷即易之
三五度可瘥

茸珠丸 鹿茸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 當歸各兩半
起石各二錢 參仁 柏子仁 黃耆各七錢 附子 陽

酒糊丸

補營湯 參 蒼 陳 草 歸 芍 二地 梔子 麥冬
東仁 烏梅

參苓丸 參 苓 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮 蜜丸

巴戟丸 五味 巴戟 菰蓉 兔絲 覆盆 益智 牡蠣
龍骨 人參 麥冬 白朮 熟地 骨碎補 茴香蜜丸

益氣丸 人參 麥冬 陳皮 桔梗 炙草 五味 蜜丸

鎖陽丹 桑螵蛸三兩 龍骨 茯苓各一兩 糊丸

九龍丹 金櫻子 杞子 蓮鬚 熟地 芡實 茯苓

虛損

楊

弱冠成損嗽血喘促身熱汗泄食減便澹脉弱數此上損及

中補土生金自不易定法四君湯加熱地

砂仁
末炒

山藥茯苓神五味

白芍蓮子小麥煎湯數服血止喘熱亦定然一陽初生必交節
不至加重乃得轉危爲安

胡氏女寒熱欬嗽經斷食少肌削口乾無寐脉虛數損象已具經
云二陽之病發心脾有不得隱曲在女子爲不月二陽足陽明
胃也胃虛則受穀少而血無由生故症見心脾心主血脾統血
情志不遂日爲憂思煩擾以耗竭之故月水枯也宜滋化源倣
立齋先生法朝用歸脾湯加柏子仁夕用都氣丸加杞子白芍

棗仁貝母兩月諸症悉退後經自通而病霍然

狄氏月閉勞熱醫用通經之品喘嗽氣促怔忡自汗又用寒涼退熱食減肌削乍寒乍熱診其脈弱數而促此下損及中也急用潞參茯神黃耆炙草白芍當歸五味棗仁銀柴胡四劑諸症漸減加山藥熟地炭蓮棗補心脾兼調肺腎熱嗽悉除能進食矣逾月後忽腰腹痛下胎形三寸許兒頭已半損爛于深自咎臨診未審其母舌青黑與否然計其經閉後已六閱月乃知胞宮血涸胎形不長乾熱累月必反枯癢深隱通經破血藥數十劑不能令墮俟氣血通調瘀腐之隔膜者乃去而不復留也況血枯經閉漫與三稜莪朮牛膝桃仁不速之斃乎誌此爲權乾汁

者鑑

李 肩挑傷力欬嗽胸痛其損在肺用黃耆潞參扶神百合貝母杏仁當歸白芍甘草紅棗二服卽應此從安肺湯加減經所謂損其肺者益其氣也

畦 肝腎陰虛損久不復冬至後痰欬粉紅嗽聲子夜特甚想虛陽失藏龍火不伏交子時陽氣一動炎灼上陵浸至嬌臟受戕身熱喘促近又食減無味午後頰紅時覺慄慄憎寒是陰傷及陽非黃地酸膩可效必用甘藥培元佐以介屬潛陽冀其封固蟄藏至立春前後地氣上騰症不加重爲幸潞參山藥百合甘草五味白芍牡蠣淡菜阿膠數服漸平

堂弟喘氣急脉弦數適逢秋令予謂此火刑金象也當滋化源
以自知醫雜用梨膏止嗽予謂非法入冬寒熱間作厥氣衝逆
灰痰帶紅良由陽亢陰虧龍雷並擾冬藏不密今近立春地氣
上升內氣應之喘嗽勢必加重擬方阿膠化山藥炒各二錢洋參熟
地炒茯神藕節各三錢川貝母炒研一錢甜杏仁炒研錢半棗仁炒研八分五味
五分數服頗效又五更服燕窩湯晚服秋石湯降虛火而喘定

堂弟肺主出氣腎主納氣今腎少攝納時交驚悸陽氣大升兩關
尺通滑兼並氣由衝脉逆衝而上子夜陽動喘嗽汗洩必起坐
不能安卧皆真元不納之咎屢用參耆保固肺脾既屬不濟卽
用知藥名爲滋腎豈能驟安倣葉氏鎮攝法青鉛三錢牡蠣煅研錢半

扶神三錢五味八分炮薑四分遠志炒炭錢半故紙鹽水炒一錢三服氣平嗽止

飲食大進弦脉頓減後用峻補膏方得痊

王 勞力傷精石尺偏旺是火水未濟之象日晡寒熱嗽血神疲

大宜小心調攝否則火燃金燥吐紅嗽喘行將日甚矣五味三錢

熟地山藥茯苓杞子丹皮各二錢潞參三錢白芍川貝各一錢半遠志八錢

蓮子十數服諸症俱平

妹 積年羸怯經當斷不斷熱從腿膝上蒸今歲厥陰風木司天

又值溫候地氣濕蒸連朝寒熱煩渴寤不成寐悸欬善驚總由

陰虧心火燔灼兼乘木火司令氣洩不主內守陽維奇脉不振

網維越人云陽維為病苦寒熱今簪衛欲空足寒骨熱所固然

醫案 卷之十一 虛損 人

已先培元氣退寒熱待津液上朝冀煩渴漸平用潞參扶神麥
冬白芍丹皮龜板熟地柏子仁紅棗蔗汁三服寒熱大減煩渴
漸止但覺寒起足脛原方去麥冬龜板加首烏杞子牛膝炒壯
其奇脉二服不寒但熱原方又去首烏杞子柏子仁加蓮子龍
眼肉數十服遂安

貢 弱冠末室勞力傷陽寒熱痰紅欬則氣促嘔沫頭眩食減色
悴肌羸半載不復脉來虛數右部尤少神乃肺氣受傷脾元亦
憊理陽兼泄濁爲宜用六君湯加山藥蓮子南棗淡薑煎服四
劑寒熱止濁逆平去半夏加貝母茯神五味嗽稀而食進數脉
較減又加薏米芡實黃耆歸芍煎丸兼服而瘳 後因自服地

黃滋膩丸劑食減便溏餌牛肚瀉痢不止又迫於完姻虛嗽聲
啞午餘寒熱旦夕利數行脉益虛數思食減脾損痢久腎傷陰
陽告殘廼求挽拯用藥頗難且終罔濟姑與扶肺脾以攝腎壽
參茯苓炙草白芍山藥益智訶子五味蓮棗數服甚平但氣下
陷則痢迫體慄寒手足心熱寐必口乾此陽虛生寒陰虛生熱
而津不上朝也朝用補中湯去柴歸加益智茯苓晚用熟地炭
五味棗仁白芍貝母薏米麥冬俱炒蔗汁冲服寒熱輕痢如故與
桃花湯加參苓五味烏梅溫攝下焦痢仍不減由腸液滑泄已
久氣虛不受溫攝而喉痛聲嘶欬吐白沫因春分節後氣溫升
泄故也轉方仍用參苓蓮藥補脾五味白芍斂肺沙參桔梗清

咽熱地炭欬解育陰訶子牡蠣帶下

謝氏崩帶後蒸熱頭暈齒痛食後愛腐痞惡不時便瀉始由衝任
經傷陰虛生火醫用青鉛鎮攝虛火愈炎中氣愈陷反使變際
汗多如水下部泄氣如風不知症緣陰虧肝陽失制上則爲眩
暈下則爲蒸瀉中則爲風翔浪掀食入漾漾欲嘔治宜和陽熄
風佐以運脾否則補虛添脹滋腎礙脾勢必食減肌削延成下
損及中之咎杞子炭甘菊炭牡蠣粉白芍山梔神麴俱炒半夏青鹽
炒茯神丹皮嫩桑葉浮小麥煎湯三服諸症漸平原方去梔麴加
鱉甲山藥熟地炭蒸熱漸愈

族弟嗜飲傷中濕熱內蘊欬潮熱腹痛嘔瀉脉沈小數左尤瀼

不戒飲則成酒勞生疝茯苓薏米橘紅茴香製半夏枳椇子砂
仁湘蓮炒數服諸症稍定乃用葛花解酲湯去青皮乾薑加製
半夏數十服全愈

沈

少年羸怯晡熱噎嗽頭眩食減頻嘔苦酸濁沫大便忽澹忽

秘脉弦數右尺搏指由相火太强疏泄失司痰濁不降必夢泄

足心如烙先驅濕熱以熄龍雷黃蘗

酒炒六分

半夏

青鹽製錢半

茯苓薏

米各三

錢吳萸鹽湯泡五分

遠志山梔澤瀉

各八分

橘紅

錢一

六服痰火降

遺泄止去吳萸山梔加生白朮

錢半

五味

三分

牡蠣粉

錢二

諸症俱減

調理得平

服姪誦讀神疲晡寒宵熱汗嗽食減脉虛右尺弦大此爲童損由

心脾肺兼及腎陰倣立齊先生治法朝用補中益氣湯去升柴
加茯苓棗仁小麥晚用六味湯去山萸加白芍鱉甲五味十數
劑寒熱止而精神復

勞瘵論治

凡男子之勞起於傷精。女子之勞由於經閉。小兒之勞得於母胎。無不始於陰虛生熱。然其源流宜條列施治焉。有雜病久不愈。因積損成勞者。宜調營養衛湯。有思慮太過。鬱損心脾而成勞者。宜歸脾湯。有房勞傷腎。遺淋痿弱而成勞者。宜鹿胎丸。有飢飽傷脾而成勞者。宜補中藥。有積勞疲瘦。嗜卧寒熱而成勞者。宜十四味湯。有負重致傷而成勞者。宜補中藥。有傷暑咯血而成勞者。清暑益氣湯加減。有縱酒傷脾而成勞者。宜補中藥。有童年稟賦怯弱。骨蒸黃瘦而成勞者。宜麥煎散。有婦女經閉。由血熱血枯而成勞者。宜逍遙散。補血養陰丸。有情竇初開。積想在心。真陰煎耗而成勞者。宜清離滋坎丸。其為勞熱也。有氣虛熱。必兼少氣自

汗體倦、心煩。入珍湯加減。有血虛熱必兼燥渴睡卧不安。聖愈湯參有

往來潮熱必兼膝軟骨節痛。參苓建中湯。有骨蒸熱必兼肌瘦頰紅。甲

散河車丸。有五心熱必兼體痛口乾。逍遙散參生脈散。有遍體熱必兼神

困肌削。十四味建中湯。有病久結痰注絡腹脇常熱惟頭面手足於寅卯

時乍涼。六君子湯加薑汁竹瀝。其為勞嗽也。或由陰傷陽浮金燥喉癢致嗽。

宜甘潤養肺。清安膏。或由腎水虛涸火燥肺金致嗽。宜壯水滋液。六

或加麥味。或由脾土先虛不能制水水泛為痰致嗽。立效方加陳皮白朮

由元陽下虧痰涎喘促虛寒致嗽。六味回陽飲理中湯八味丸。至勞嗽失音會

厭傷也。猪脂和肺痿吐膿形肉脫也。白鳳膏勞嗽兼喘腎不納氣

也。都氣丸加參耆牛膝蛤蚧或杏仁膏。其見為血症也嗽血出於肺憂悲所致也。宜

冬二母白芨百合桔梗阿膠或潤肺膏。痰血出於脾思慮所致也。宜荅耆地解丹陳

吐血出於心驚恐所致也。宜丹參山藥茯神當歸血成塊出於肝

悲怒所致也。宜柴芍丹梔生地棗仁咯血出於腎房慾所致也。宜

膝丹荅遠志童便阿膠或坎離既濟丹。嘔血出於胃中氣失調火迫絡傷也。宜犀角

凡積勞失血久病吐血。並宜獨若夫尸疰瘵症由瘵久生蟲食人

臟腑其症蒸熱哈嗽胸悶背痛或面色眊白兩頰時紅亦有面色

不衰肌肉不損名桃花疰。宜紫金錠又有尸鬼作祟其症沈沈默

默不知所苦累月經時羸頓至死同氣連枝多遭傳染名傳尸勞

當補虛以復其元。養營湯殺蟲以絕其根。十疰丸凡診視者不宜

空腹宜飽食或佩安息香及麝香則蟲鬼不敢侵也。

附方

久勞 調營養胃湯 參 朮 陳 苓 歸 芍 麥 味 二地

鬱勞 歸脾湯 人參 焦朮 山藥 遠志 棗仁 龍眼 各二錢 炙膏

水煎 薑棗 錢半 當歸 遠志 各一錢 木香 甘草 各五分

房勞 鹿胎丸 鹿胎煮 熟地八兩 用人乳粉 山藥各一兩 排蒸

乳浸晒 兔絲子十兩 酒煮 杞子八兩 乳浸 製首烏六兩

黃耆五兩 酥炙 黃蒿膏丸 補中益氣湯 見一卷中風

積勞 十四味建中湯 參 耆 桂 附 朮 草 歸 芍 芎 芩

暑勞 清暑益氣湯 見一卷暑

酒勞 葛花解酲湯 見一卷濕

童男 女男 女男 女男 女男

麥煎散

赤苓 歸朮 地草 柴胡 鼈甲 小麥
石膏 常山 乾膝 大黃 末四味慎用

逍遙散

見一卷火

補血養陰丸

歸芍 丹地 麥味 牛膝 杞子
青蒿 鼈甲 川斷 茯苓 益母膏丸

清離滋坎丸

六味丸料加 二冬 生地 當歸 白芍
知母 黃藥 白朮 甘草 吐血加山藥

蓮子

欬加枇杷葉 貝母 栝蒌 痰加橘紅 熱加骨

皮

嗽加五味 怔忡加遠志 棗仁 遺精加龍骨 牡

蟬

咽瘡加甘草 桔梗 痰喘加蘇子

久欬

加阿膠 五味 紫苑 麥冬

八珍湯

見一卷中風

聖愈湯

參耆 芎歸 二地

人中白丸

歸芍 二地 人中白 白朮 鼈甲 青蒿
羚羊角 阿膠 百部膏丸

參苓建中湯

參苓 前胡 細辛 陳草 桂枝 半夏
麥冬

熱潮 熱血 熱虛 熱虛

骨

蒸

骨

蒸

骨

蒸

骨

蒸

骨

乾

脾

健

嗽

血

滋

液

勞

嗽

嗽

鯢甲散

柴胡

鯢甲

知母

秦艽

當歸

烏梅

青蒿

河車丸

紫河車

人乳

地骨

龜甲

銀柴胡

以百部

青蒿

童便

陳酒

二仙膠

鹿膠

龜膠

人參

杞子

生脉散

見一卷暑

六君湯

見一卷中風

清安膏

麥冬

生地各十兩

橘紅三兩

桔梗

甘草

六味丸

貝母各二兩

龍眼

苡仁各八兩

薄荷

五錢

禽化丸

玉露霜

柿霜

貝母

百合

茯苓

海石

秋

立效方

石 甘草

薄荷

五味子

款冬

天冬

葱白

川椒每歲一粒共為末納猪肺中荷葉包蒸五更食

痿肺痿肺寒虛虛陽虛陽

參附
乙錢

薑各二錢
汗加黃耆

熱地五錢
泄加白朮

當歸三錢
烏梅

見一卷中風

見一卷中風

二冬
蒲黃

薄荷

二地京墨

廚杏

蜜桔

歸

款冬

阿膠

白鴨

隻

元集二升

參苓

胃散一升

陳酒

淨將棗去核每瓶納參苓平胃末入鳴腹麻線紮定砂鍋內煨將酒三次添入以乾爲度其搗爲丸煎人參湯下

六味丸加五味子

羊肺

杏仁

柿霜

蛤粉各一兩

真酥一兩

易見一卷中風

老
歸

二、快

川芎

半

各一兩

相子仁

聚仁

遠志

五味

人參

桂心各五錢

炙草

張子

與

圖

肝血腎血胃血殺蟲殺蟲補虛鬼症役蟲

一錢 為散

煎服五錢

柴胡疏肝湯

香附

柴胡

陳皮

芎

芍

枳

草

坎離既濟丹

二地

二冬

二茯

歸

芍

參

味

莢

犀角地黄湯

見一卷溫

紫金錠

芡茹

五倍

大戟

辰砂

雄黃

麝香

蘇合香丸

見一卷中風

養營湯

參

苓

朮

草

地

芍

歸

味

青

志

十疰丸

雄黃

巴霜

各一兩

人參

細辛

附子

麥冬

桃奴丸

桃奴

七個

另研

玳瑁

細一兩

安息香

一兩

黃各三錢

同熬成膏

另以辰砂

犀角

各五錢

桃仁

十四個

椎

共研細和膏為丸

芡子

大封固

陰乾

每一丸

參湯下

癆瘵

劉氏陰瘧延久暫愈臨蓐後將息失宜膚栗骨戰寒熱沈綿陰陽

二維不司統束護衛用理陽攝陰法鹿角霜補骨脂當歸各一錢

潞參杞子遠志

各二錢

茯神

三錢

生白朮

八分

炙草

六分

小麥

半合

紅棗

五枚

十服諸症漸減但右脉沈小左寸虛原方去鹿角杞子骨脂加

補心脾之藥用山藥棗仁蓮子白芍

俱炒

數服飲食進寒熱除繼

由變生反目氣逆欬嗽失音面晦是臟真日漓神采內奪也切

忌清肺理嗽速用五味山藥茯神潞參杞子核桃肉訶子皮蓮

聚數十服嗽止音復後加調補獲痊

印氏脉細滯營衛素虧秋冬背寒脛冷經事愆期從未孕育乃衝

任督經虛宿恙延爲勞怯重症近日欬嗽唾痰多在夜半及清晨爲劇想脾聚宿痰瘕時爲呼吸引動因噎欬不已先服平嗽煎劑再訂膏方耑理奇脉川貝甜杏仁萆皮俱炒茯苓前胡橘紅白朮炙草潞參桑皮蜜炙薑棗煎三服嗽定去萆皮前胡加蓮子山藥五味杞子俱炒再服數劑俟嗽愈服膏方骨脂杞子沙苑歸身杜仲兔絲餅核桃肉芡實炒牛膝酒蒸首烏製茯神玉竹同熬用鹿角膠加倍收膠日服五錢宿恙漸瘳

欬嗽論治

肺爲華蓋。職司肅清。自氣逆而爲欬。痰動而爲嗽。其症之寒、熱、虛、實、外、因、內、因、宜審辨也。肺寒嗽必痰稀面白畏風多涕。當溫肺固衛。款冬、紫菀之屬。加入玉屏風散。肺熱嗽必痰稠面紅身熱喘滿。當降火清痰。黃花粉、海石、栝實、竹茹之屬。加入清肺飲。肺虛嗽必氣逆汗出顏白飧泄。當補脾斂肺。六君湯加山藥、五味子之屬。肺實嗽必頓欬抱首面赤反食。當利膈化痰。瀉白杏、葶藶之屬。外因者六淫之邪自表侵肺。治用辛散則肺清而嗽止。內因者五損之病自下及上。治在甘潤則肺清而嗽安。治外因嗽感風者辛平解之。桂枝防風之屬。感寒者辛溫散之。紫蘇、薑杏之屬。感暑者辛涼除之。香薷、薄荷、竹葉之屬。感濕者苦降淡滲之。厚樸、通草、薏仁之屬。感燥者甘涼清潤之。

玉竹花粉。感火者甘寒苦辛滌之。麥冬、石膏、桔梗、山梔、象貝之屬。濕熱痰火阻氣。

清降辛泄之。茯苓、沙參、杏仁、前胡、桑皮之屬。治內因嗽肝膽氣升犯肺者泄木降。

通。鈎藤、梔子、枳壳、丹皮、陳皮之屬。土虛不生金者胃用甘涼。參、麥、山藥、扁豆之屬。脾用甘溫。

西君。腎陰虛火炎金燥者。熱地、五味、人乳、燕窩、阿膠、胡桃之屬。滋液填精腎陽虛。

水泛為痰者。益智、沉香、沙苑、子、腎氣丸之屬。納氣歸腎勞心動火者。歸脾湯、去木香、加麥冬、五

味、熬膏、潤養心血久嗽不已。人參、蛤蚧、散、化、如、嗽、丸。

經云五藏六腑皆令人欬。非獨肺也。肺欬則喘息有音。千金、五味子、湯、去、續

斷地黃、赤小豆、加心欬則心痛喉中如梗。涼膈散、去、硝、黃、肝、欬、則

麥冬、玉竹、細辛。枳殼、黃、散、去、芎、防、脾、欬、則、右、肱、下、腋、下、痛、引、肩、背、六、君、湯、加

脇痛。加、肉、桂、橘、紅、蘇、子。脾欬則右肱下脇痛引肩背。枳殼、桔、梗、

腎欬則腰背引痛。都、氣、丸、加、參、麥、胃、欬、則、嘔、甚、長、蟲、出、異、功、散、加、膽、欬、則

川椒、烏梅。

嘔○膽○汁○

小柴胡湯

大○腸○欬○則○遺○矢○

赤石脂禹餘糧湯

小○腸○欬○則○失○氣○

芍藥甘草湯

膀○

胱○欬○則○遺○溺○

茯苓甘草湯

三○焦○欬○腹○滿○不○欲○食○飲○

七氣湯加黃連枳實

夫○五○臟○久○

欬○乃○移○六○腑○

脾欬不已則胃受肝欬不已則膽受心欬不已則小腸受肺欬不已則大腸受腎欬不已則膀胱受六腑

久欬不已則三焦受

然終不離乎肺脾腎也蓋肺為貯痰之器脾為生痰之

源○而○腎○與○肺○實○子○母○之○臟○因○痰○致○欬○者○痰○為○重○主○治○在○脾○因○欬○動○

痰○者○欬○為○重○主○治○在○肺○無○痰○乾○欬○者○陰○虛○為○重○主○治○在○腎○景○岳○謂○

虛○勞○乾○欬○乃○肺○腎○不○交○氣○不○生○精○精○不○化○氣○當○分○有○火○無○火○治○之○

如○臟○平○無○火○止○因○肺○虛○補○氣○自○能○生○精○

宜五福飲之類

如○臟○氣○微○寒○非○辛○

不○潤○補○陽○自○可○生○陰○

宜理陰煎或六君湯

如○內○熱○有○火○須○葆○真○陰○壯○水○自○能○

制○火○

宜一陰煎或貝母丸

切○忌○消○痰○開○鬱○使○氣○愈○耗○水○愈○涸○也○其○脾○肺○虧○損○

致欬嗽喘促。畏寒嘔瀉及脉見細弱。症見虛寒。欬久不已者。均勿

清嗽。但補元氣。嗽自止。六味回陽飲。或理中湯。

以四時論之。春季欬。木氣升也。治宜兼降。前胡、杏仁、海浮、夏、

火氣炎也。治宜兼涼。沙參、花粉、麥冬、知母、元參之屬。秋季欬。燥氣乘金也。治宜清

潤。玉竹、貝母、杏仁、阿膠、百合、枇杷膏之屬。冬季欬。風寒侵肺也。治宜溫散。蘇葉、川芎、

之以一日計之。清晨嗽。為氣動宿痰。二陳湯。加貝母、枳殼。上午嗽。

屬胃火。石膏、川、午、後、嗽、屬、陰、虛、四、物、六、黃、昏、嗽、屬、火、浮、於、肺、當、斂、

而降之。五、味、子、五、夜、半、嗽、為、陽、火、升、動、宜、滋、陰、潛、陽、六、味、丸、加、牡、

肺本嬌。臟畏熱。畏寒。火刑金。燥故欬。無痰。水、冷、金、寒、故、嗽、有、聲、當、

分新久。虛實。治之。感風暴嗽。鼻流清涕。桂枝湯。加葱、豉。感寒暴嗽。肩背怯

冷。華蓋。兼感風寒暴嗽。鼻塞聲重。飲。蘇。欬逆倚息不得卧。小。龍。湯。風。

溫化燥。喘。欬。金。匱。麥。門。冬。湯。去。半。夏。加。玉。竹。沙。參。杏。仁。貝。母。火。熱。嗽。喉。啞。痰。稠。加。減。涼。感。

濕致嗽。面目浮腫。豆。豉。杏。仁。通。草。滑。石。半。夏。茯。苓。大。貝。之。屬。一。欬。痰。即。出。脾。濕。勝。也。二。

湯加尤。連。欬。痰。不。出。肺。燥。甚。也。桔。梗。湯。去。桑。皮。防。已。加。玉。竹。客。邪。傷。肺。久。嗽。不。

止。安嗽化。久。嗽。中。氣。虛。營。衛。兼。損。歸。者。建。中。湯。肉。傷。嗽。豚。虛。氣。乏。補。中。益。氣。

湯去升柴。脾。虛。食。減。久。嗽。歸。者。異。功。散。胃。虛。嘔。逆。作。欬。大。半。夏。湯。加。麥。味。白。芍。南。粳。加。砂。仁。茯。

苓。橘。紅。肺。胃。虛。寒。欬。沫。吐。食。溫。肺。寒。飲。停。胃。攻。肺。致。欬。肺。湯。半。夏。溫。上。

煨薑。氣。喘。欬。脇。痛。肝。木。乘。肺。也。七。氣。湯。加。思。慮。勞。神。乾。嗽。心。火。刑。金。也。

生脉散。加。茯。神。貝。母。腎。虛。肺。燥。喘。欬。都。氣。丸。喘。嗽。痰。多。怯。冷。生。料。

熟地。棗。仁。龍。眼。肉。腎。虛。肺。燥。喘。欬。加。麥。冬。喘。嗽。痰。多。怯。冷。腎。氣。

丸煎。肺。虛。喘。嗽。吐。血。門。冬。清。欬。痰。見。血。脉。虛。數。六。味。丸。料。煎。加。阿。膠。秋。石。

頁。登。治。嗽。卷。之。二。欬。嗽。寒。

傷風 惡風自汗脉浮加味桂枝湯 傷寒 惡寒無汗脉緊加味麻黃湯 寒

嗽 痰多氣逆六安煎 熱包 熱鬱肺俞遇秋冬寒涼輒發欬寸脉

堅聲音窒但解其寒而熱自散麻杏石甘湯 熱包 先傷風寒

痰嗽未止更傷炎熱喘欬聲嘶宜兩解其邪葳蕤湯 風熱風

鬱化熱宜辛涼散解薄荷梔梗杏仁 風溫 風溫上侵頭脹咽

痛喘欬失音宜清輕涼解桑葉象貝連翹薄荷 溫邪 春冬溫

邪犯肺喘欬氣窒喉痛治同 風溫如熱鬱者加山梔豆豉鬱金 暑

暑熱蒸嗽及風襲入肺衛寸脉大喉癢口渴俱宜微辛微涼竹葉

蘆皮杏仁石暑兼 欬而痰稠氣阻溺清宜苦降淡滲厚樸黃芩

膏薄荷香薷濕 苡仁滑石通草花粉燥 秋燥嗽渴氣促宜甘潤玉竹沙參麥冬梨蜜杏仁

西瓜翠衣或益元散

蔗汁之屬。或復火逆上氣。咽喉不利。金匱麥門冬湯。去半

火熱乘肺。欬唾有血。千金麥門冬湯。去麻黃薑。

喘。欬而上氣。蘇子喘。欬發熱自汗。安肺欬逆上氣。喉中如水雞聲。

射干麻黃湯。肺脹喘欬。鼻扇肩擡。越婢加欬而喘急。咽燥如有物塞。

唾血者。杏仁肺虛久嗽。作喘。補肺阿膠散。喘促脉沈數。五味子湯。

勞虛勞乾欬。瓊玉膏。或金脾肺傷損。勞嗽憎寒。壯熱。團參心腎虛。

發熱盜汗。勞嗽無痰。劫勞欬而無痰者。人參同蜜煎。胡桃肉細

應夢散。脾肺虛寒。怯冷痰嗽。加味理腎陰虛。脉細數。下午寒熱。乾

欬。頰紅。晨服異功散。夜服六味丸。腎陽虛。脉微弱。水泛為痰。七味地肺勞久

嗽。飢則胸中大痛。視上唇有白點如粳者。此蟲嚙其肺。百部膏。加烏梅。

橫下其蟲自愈。經年嗽，藥不瘥，餘無他症者，與勞嗽異。一味百部膏。

有暴嗽，諸藥不效。服生料鹿茸丸即愈。乃腎虛也，不可以暴嗽而疑遽補

之非。

啞氣促滿悶失音。通聲煎。肺實痰壅。宜杏、桔、薑、橘、貝、枳、竹葉之屬。肺虛喉燥。宜生

加玉竹、款冬花、蜜。外感寒包熱者。細辛、半夏、蜜。內傷火刑金者。六味湯、合生脉

散。頓欬至聲不出者，痰鬱火邪。桔梗湯、加貝母、枇杷葉。久嗽失音。杏仁膏。

肺上氣喘，脹脉浮大。越婢加半夏湯。肺脹欬喘，脉浮，心下有水氣。小青龍湯、加石膏。

湯肺脹欬，左右一偏不得卧，動則喘急，息重，此痰挾血瘀。宜當歸丹。

皮、赤芍、桃仁、枳殼、桔梗。如外邪去後。宜半夏、海石、香附、桔、薑、仁、甘草、竹瀝、薑汁。

吐嗽欬，嘔并作，為肺胃俱病，先安胃氣。二陳湯、加蘆根、薑汁、枇杷葉。虛者六君湯，加桔梗。

欬

吐痰食俱出。二陳湯加枳。食積痰嗽。二陳湯加栝蒌山查。尤杏仁細辛。

欬嗽脉候

欬嗽脉浮爲風。緊爲寒。洪數爲熱。濡細爲濕。寸關濇難而尺內弦緊爲房勞陰虛。右關濡大爲飲食傷脾。左關弦數爲痰極肝傷。遲濇肺寒。洪滑痰多。弦濇血少。脉出魚際爲逆氣喘急。肺脉微急欬而唾血。脉或沈或浮聲不嘶者可治。脉來洪數形瘦面赤腎氣衰而聲啞者難療。亦有肺絡痰壅聲啞者不在此例。暴嗽不得卧爲肺脹可治。久嗽左不能卧爲肝傷。右不能卧爲肺損皆難治。久嗽脉弱者生。實大數者死。欬嗽形羸脉形堅大者死。沈緊伏匿者死。浮直者可治。浮軟者易治。欬而脉虛必苦胃以有支飲在胸中也。

嗽久嗽久血養陽補肺瀉脾補嗽火痰清衛固

附方

玉屏風散 見一卷中風

清肺飲 杏貝 苓各一錢 桔 草 味 陳各五分

清肺飲 二母 杏 桔 薄荷 赤茯 天冬 甘草各七分

六君湯 見一卷中風

瀉白散 見一卷火

腎氣丸 八味丸加 牛膝 車前

歸脾湯 見本卷勞瘵

人參蛤蚧散 人參五錢 蛤蚧酥炙一對 杏仁 甘草各五錢 二母 茯苓 桑皮各三兩 茶服

喻化丸 熟地 阿膠 五味 貝母 款冬 杏仁 人參 甘草 蜜丸

嗽久 欬肺

劫嗽丸 訶子 百藥煎 荊芥 蜜丸

千金五味子湯 五味 桔梗 紫菀 炙草 續斷各一錢
竹茹三錢 赤小豆一撮 生地 桑皮各

錢五

涼膈散 見一卷中風

枳殼煮散 枳殼 桔梗 甘草 細辛 葛根 肉桂 橘
紅 蘇子 薑 棗

都氣丸 見一卷火

異功散 見一卷中風

小柴胡湯 見一卷溫

赤石脂禹餘糧湯 赤石脂 禹餘糧各二兩 研水煎

芍藥甘草湯 白芍 甘草各四錢 水煎

欬心 欬肝 欬腎 欬胃 欬胆 欬大腸 欬小腸

陽壯損治陽補陽補水壯水壯陽補氣補痰三痰

茯苓甘草湯

茯苓二錢 芍藥二錢 甘草二錢 大枳實二錢

炙甘草一錢

桂枝二錢半

薑五

七氣湯

半夏五錢 厚朴三錢 茯苓四錢 紫蘇二錢

薑棗水煎 名三因四七湯

紫蘇二錢

五福飲

見一卷中風

理陰煎

熟地三錢 當歸一錢

炮薑各二錢

炙草

肉桂各

一陰煎

熟地三錢 生地一錢 白芍一錢 麥冬一錢 丹參各二錢

貝母丸

二母

二冬

二地

歸芍

甘草

六味回陽飲

見本卷勞療

理中湯

參薑朮草 名加味理中湯

加陳苓

辛

夏

味

棗

劫勞散

歸芍各錢半 熟地二錢 參耆苓草

八味丸

見一卷中風

錢

半夏二分

消痰補血風嗽散寒疏風行水潤燥降火疏肺止咳欬

二陳湯

見一卷中風 加蘇 杏 桔 名加味二陳湯

四物湯

地 芍 歸 芎 或加阿膠

桂枝湯

桂 芍 草 薑 棗

華蓋散

麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤茯苓 橘紅各一錢

芎蘇飲

參 蘇 夏 枳 陳 草 枳 桔 芎 柴

小青龍湯

麻 桂 辛 芍 薑 草 夏 味

金匱麥門冬湯

見一卷燥

加減涼膈散

麴 梔 芩 草 荷 桔 竹葉

桔梗湯

杏 薑 枳 桔 歸 耆 草 貝 苡仁 桑

安嗽化痰湯

杏 葛 枳 桔 半夏 橘紅 桑皮 炙

營衛補中扶脾調胃溫肺清肺風嗽寒嗽豁痰熱

歸耆建中湯

桂芍草

棗

飴糖

名小建中湯

補中益氣湯

見一卷中風

歸耆異功散

即異功散加

歸耆

大半夏湯

半夏

人參

白蜜

溫肺湯

白芍桂汁炒

半夏

薑

味

辛

枳

肉桂

生脉散

見一卷暑

加味桂枝湯

即桂枝湯加

防風

杏仁

前胡

細辛

加味麻黃湯

麻桂

杏

草

名麻黃湯

此加半夏

六安煎

陳皮錢半

半夏

茯苓各二錢

炙草

杏仁各

一錢

麻杏石甘湯

麻

杏

石

草

散風熱包寒利濕潤燥清熱定喘保肺上氣肺脹喘咳

金沸草散

旋覆花卽金沸草
錢半 赤茯苓六分

前胡 細辛各一錢 荆芥
半夏五分 炙草三分 薑棗

茂薤湯

見一卷溫

益元散

見一卷溫

復脈湯

見一卷中風

千金麥門冬湯

見一卷燥

蘇子膏

蘇子

杏仁

生地

薑汁

白蜜收膏

安肺湯

參 苓 各一錢

北 草

歸 芍

芍 芎

麥 味

桑 皮

射干麻黃湯

射干三錢

紫苑 款冬各三錢

麻黃 五味各一錢

細辛八分

薑 棗

此加

越婢加半夏湯

麻 石 薑 草 棗

名越婢湯

此加

杏仁膏

杏仁 阿膠

蘇子各二兩

真酥三兩

薑汁一

合收膏

蘇子各二兩

真酥三兩

薑汁一

合收膏

蘇子各二兩

久效

補肺阿膠散 人參 阿膠各二兩五錢 茯苓 馬兜鈴 糯米各五錢 杏仁廿粒 炙草四錢 爲末

每服三錢

喘促

五味子湯 參 杏 麥 味 陳 薑 棗

乾欬

瓊玉膏 見一卷燥

勞嗽

金水六君煎 熟地三錢 當歸 半夏 茯苓各二錢 陳皮錢半 炙草一錢

脾肺

團參飲子 人參 紫菀 阿膠 百合 細辛 款冬 杏仁 天冬 半夏 五味 桑葉 甘草

無痰

觀音應夢散 人參 白蜜 核桃肉 或煎服

水泛

七味地黃丸 見一卷中風

殺蟲

百部膏 百部一味熬

補腸

鹿茸丸 鹿茸 牛膝 五味各二兩 石斛 巴戟 附子 川棟 山藥 肉桂 杜仲 澤瀉各一兩 沉香

鬱火嗽啞

五錢
酒糊丸

通聲煎

杏仁
細辛

桔梗湯

桔梗
薄荷

五味

竹茹

梔子

木通

真酥

黃芩

菖蒲

薑汁

前胡

人參

白蜜

貝母

桂心

棗肉

知母

款冬

香附

香附

欬嗽

楊氏秋間嘗嗽子午刻尤甚欬則傾吐晡後熱渴面赤經期錯亂此肺受燥邪不司肅降爲標金受火克不能生水爲本急則治標先於潤劑兼佐鹹降用杏仁薏仁蘇子半夏丹皮麥冬百合三服欬吐已止能納食而虛火亦退後用燕窩清補肺氣再用六味丸料加白芍五味淡菜熬膏蜜收服愈

張氏產後感風欬嗽用辛散輕劑不效改用阿膠五味當歸潞參茯苓甘草甜杏仁炒一啜而安可知橘桔芎蘇虛體慎用

族某乾欬無痰臥覺氣自丹田衝逆而上則連欬不已必起坐稍定是氣海失納矣診脉右尺偏大腎陽易旺寐後肺氣不敢下

交於腎延久卽喘之萌速固其根蒂爲要三才固本丸服效

按肺主氣而氣根於丹田

腎部

故肺腎爲子母之臟必水能制火

而後火不刑金也二冬清肺熱二地益腎水人參補元氣氣者水之母也

毛

衰年久嗽自秋入冬憎寒食減口不知味脉虛少力爲脾肺

俱傷中氣不足之候宜扶脾陽以生肺金潞參扶神炙草山藥黃耆炮薑五味紅棗湖蓮數服漸愈

洪

冬季乾欬夜半特甚醫用杏萸橘薑桑皮等藥氣促不止診

其脉兩尺洪而大此陽失潛藏金畏火炎象也六味湯去黃丹加五味百合白芍漸愈此症若尙治肺延久不痊必成上損

須壯水以制龍火之亢逆而嗽自平

鍾

中年肝腎陰虛尺脉偏旺夜熱欬嗽醫藥數月或以欬爲肺有蓄水或以嗽爲外感寒邪浸至頭眩口乾下元乏力近又憎寒減食面色萎悴足心如烙據脉論症必由夢洩傷精漸成勞嗽無疑今慄慄怯寒食不甘味毋使陰傷及陽延成下損及中之咎六味湯熟地炒用加參味貝蓮七服熱減嗽輕又照六味湯去萸泄加石斛麥冬貝母五味潞參蓮子煎服數劑接服丸方用前藥加魚鱉淡菜等蜜丸而愈

毛

久嗽夜甚晨吐宿痰酸沫脉右虛濡左浮長已似木氣貫膈犯肺乃因臂痛服桂枝川烏等藥酒肺爲嬌臟不受燥烈若欬

益加喘急上氣此爲治病添病當主以辛潤佐以酸收經所謂
肺苦氣上逆以酸補以辛泄也清肺飲去桔梗加白芍蘇子桑
皮蜜炙數服痰欬稀喘亦定但納穀少用培土生金法去桑皮五
味加山藥苡米俱炒潞參茯神蓮子炙草南棗粳米煎湯數服而
食進

王姓兒秋涼感風夜熱頓欬連聲臥則起坐立則曲腰喘促吐沫
汗出痰響由風邪侵入肺俞又爲新涼所束痰氣交阻法宜辛
散邪苦降逆用桔梗紫蘇杏仁前胡橘紅淡薑熟嗽減一外科
以爲症感秋燥用生地五味白芍貝母等藥予曰風邪貯肺可酸斂平痰涎
阻氣可膩潤乎卽單用薑汁一盃溫服可也頻以匙挑與而愈

李

春溫痰火壅肺宵欬上氣臥不著枕心神恍惚脈浮洪舌絳口乾渴赤治先肅清太陰兼佐除煩杏仁薏仁桔梗貝母豆豉山梔蓮翹枇杷葉蔗汁二服嗽稀得寐因遠客勞神心營耗損參用養營安神生地百合棗仁杏仁茯神貝母沙參甘草二服心神安胃陰亦復可冀加餐嗣因內人語言根觸氣鬱生涎改用溫膽湯而痊

巫氏
女甥

年十四乾欬脈數頰紅夜熱無汗此虛陽升動肺金受燥若不滋化源陰日涸損根伏矣據述天癸未至白帶頻下始信真元不固乃以潞參山藥茯神扶脾元白芍丹皮瀉陰火甜杏仁百合止嗽五味訶子斂肺炙草紅棗和中調營一服嗽輕加熟

地石斛而蒸熱退卽用前藥去百合訶子石斛加芡實蓮子蜜丸常服效

糜

六旬素患失血今冬溫來虛痰嗽氣阻欬則脇痛汗出熱煩

口乾脉歇止醫用消散痰嗽益劇更醫乃用炒朮半夏樸柴等

味余曰朮夏守而燥樸柴溫而升此症所忌况質本陰虧溫易

化燥宜辛潤以利肺氣則安用杏仁栝蓰貝母桑皮

蜜炙

橘皮欬

斜前胡赤苓一服安糜嗽去八九脇痛頓減脉亦和乃用燕窩

湯煎潞參茯神杏仁貝母山藥栝蓰桑皮再服更適轉側如意

矣

服姪勞倦內傷嗽用栝蓰旋覆等劑病加診脉小數右尺稍大乃

陰虛致嗽忌服表散以五味甜杏仁白芍貝母潞參杞子茯苓
蓮棗二服嗽減又三服加熱地山藥等尺脉乃斂

○冬陽不潛龍燄上擾灼肺喘嗽帶紅劇在宵分少年氣促脉

虛數慄寒夜熱損怯已成想誦讀陽升寐中必有遺泄心腎不
交精關失固且口不甘味食減於前下損及脾無清嗽治痰之
理燕窩清補希冀嗽止痰消恐初之氣已交慄寒必增安望嗽
減益脾肺交心腎調理如法寒熱可止喘嗽可平潞參山藥茯
神生黃耆皮桑皮蜜炙甜杏仁五味枇杷葉蓮子棗仁阿膠龍骨
數服嗽減寒止痰血若失去枇杷葉龍骨阿膠加炒熟地丹皮
熱漸退嗣用潞參熟地山藥茯神遠志黃耆蜜炙龍骨白芍棗仁

五味龍眼肉熬膏二料全愈

肺痿肺癰論治

肺痿者。津枯葉悴。因熱在上焦。欬久傷肺。始則寒熱自汗。口吐濁沫。或唾紅絲膿血。脉數而虛者是也。肺癰者。咽乾吐膿。因風熱客肺。蘊毒成癰。始則惡寒。毛聳。喉間燥欬。胸前隱痛。痰膿腥臭。按右脇必痛。著左卧則喘。脉滑數有力者是也。肺痿傷在無形之氣。氣傷者。調其元。肺癰毒結有形之血。血結者。排其毒。此治法之概也。分而論之。肺痿由津液枯燥。至肺管日窒。欬聲不揚。動卽氣喘。治在補氣血。生津液。佐以止嗽消痰。宜人參玉竹五味阿膠白芍麥冬當歸熟地紫苑川貝杏仁等其肺勞成痿。虛熱嗽血者。人參固本丸不時喻化肺虛喘急自汗者。安肺湯往來寒熱自汗煩渴者。紫苑散加銀柴胡蘆用蜜製欬膿血發熱盜汗者。却勞涎散

唾多。心中溫溫液液者。炙甘草湯。痰嗽。午熱聲嘶者。紫苑散加丹皮薑棗。喘欬失

音。咯血者。人參蛤蚧散。其虛寒羸瘦。噓吸胸滿者。千金生薑溫中湯。凡肺痿症。

欬唾咽燥。欲飲水者。自愈。張口短氣者。危。肺傷咯血。喉啞者。不治。

肺癰。由熱蒸肺。竅至欬吐臭痰。胸脇刺痛。呼吸不利。治在利氣疏

痰降火排膿。宜安肺桔梗湯。初起肺受風寒。喘嗽者。小青龍湯散解之。喘不得卧。

胸脹者。葶藶大棗湯瀉之。肺氣不化。水道不利者。葦莖湯疏利之。葦莖

從溺。孔去。欬逆上氣。時時唾濁者。皂莢丸滌之。皂莢丸。皂莢丸。欬膿腥穢者。

桔梗湯。開提之。欬而短氣。溺少者。參耆補肺湯調之。體倦食少。脾虛者。參朮補脾湯養之。

膿已潰者。排膿散。或金鯉湯。或薏苡根煎汁飲。大效。痰中帶血。胸痛者。桔梗杏仁煎。或肺癰神湯主之。

吐膿咽痛者。甘桔湯。加杏仁貝母。難久不斂者。川槿湯。如思慮勞心。致動陰火。

痰臭轉甚者。

六味丸加麥冬紫菀。

一症潰後宜補脾肺。滋腎水。不宜專攻其

瘡。凡肺癰症初起。痰覺腥臭。

用陳淹芥瀉溫服。或濃煎荷葉汁。加白蜜服。效。

欬則微痛。痛

在胸右。為肺之長葉。坐卧如常。飲食知味者。易治。若潰後寒熱脇

痛。痛在胸左。為肺之短葉。或坐卧不安。飲食無味者。難治。若喘鳴

不休。坐不得卧。咯吐膿血。色如敗瀉。飲食艱進。聲啞鼻扇者。不治。

肺癰已破。入風者。

濃煎葱白香豉湯頻服。

然多不救。

肺痿肺癰脉候

脉數而虛者。肺痿。數而實者。肺癰。微緊而數者。未成膿。緊甚而數

者。已成膿。吐膿如米粥者。難治。嘔膿不止者。脉浮洪而大者。難治。

肺痿六脉浮濇而急。或細數無神者。死。肺癰潰後。脉忌短濇。緩滑

面白者生弦急面赤者死

附方

固本丸

見一卷中風

安肺湯

見本卷欬嗽

紫菀散

人參 桔梗 茯苓各一錢 阿膠 甘草 紫菀各五分 知母 貝母各錢半 五味子十五粒

劫勞散

見本卷欬嗽

炙甘草湯

見一卷中風

蛤蚧散

蛤蚧十對酥炙 二母 桑皮 茯苓各二兩 人參 甘草各三兩 杏仁五錢 爲末每服三錢

生薑溫中湯

薑 桂 陳 草 麻黃

安肺桔梗湯

杏 薑 枳 桔 歸 耆 二母 桑皮 防已 百合 苒仁 地骨 葶藶 味 草

肺勞喘嗽血虛勞涎唾喘欬寒虛肺癰

表邪宿水疏利降濁開提補肺健脾化膿排膿膿胸痛

小青龍湯 見本卷欬
葶藶大棗湯 甜葶藶三錢炒研 大棗十枚去核

葶藶湯 蘆管取節 薏仁 桃仁 瓜瓣 甜瓜子

皂莢丸 皂莢去皮弦子酥炙研末蜜丸梧子大以棗湯服三

桔梗湯 見本卷欬嗽疏肺

參耆補肺湯 參耆 五味 紫苑各八分 熟地 桑皮

參朮補脾湯 參耆 朮各二錢 桔 黃耆二錢半 苓 歸 陳

排膿散 參耆 芷 味 爲末每服三錢

金鯉湯 活鯉魚四兩 貝母一錢研 以鯉魚去鱗雜不見

桔梗杏仁煎 水入貝母於魚腹外以線紮之浸童便煮熟食之

肺痿肺癰 肺痿肺癰

吐膿久陰火通用

甘桔湯 甘草 桔梗

川槿湯 川槿皮 白斂 等分水煎

六味丸 見一卷中風

肺癰神湯 桔梗 銀花 炙膏 白芨各一錢 苡仁五錢

甜葶薤炒八分 甘草節錢半 陳皮錢二分 薑二片 水煎

肺癰肺痿

本 老年嗜飲熱火酒致熱毒熏肺發瘡生癰欬吐穢膿胸右痛

不利轉側脉左大初用桔梗湯去耆薑加連翹山梔四服欬稀

痛止仍宜排膿解毒用桔梗銀花

各一錢

貝母

錢半

生薏苡

錢五

當歸

甘草節廣皮

各一錢二分

白芨生耆

各一錢

甜葶藶

炒七分

數服膿稀瘡

癰皆平

韋 嗽重痰腥胸背隱痛脉數有力已成肺癰此肺受風寒蘊邪

壅熱宜疏痰導熱則呼吸自利不至脹痛喘急而腥痰漸少桔

梗湯三服兼用陳醃芥瀉汁一杯溫服愈

戴氏元氣久削痰嗽肺痿寸脉虛數少神難治之症紫菀湯三服

阿膠水煨
冲服後去桔梗知母加山藥蓮子黃耆取補土以生金嗽
熱漸減

失音論治

肺爲音所自出。而腎爲之根。以肺通會厭。而腎脉挾舌本也。夫金空則鳴。失音一症。亦如金實則瘖。金碎則啞。必辨其虛實。而後治法可詳。其寒包內熱。閉窒氣分。致失音者。以麻杏湯之屬。開其痺。其醉卧當風。邪干肺竅。猝失音者。以蘇子湯之屬。降其痰。其木火犯肺。咽乾喉痺。致失音者。以麥冬湯之屬。潤其燥。其痰熱客肺。喘急上氣。致失音者。以桔干湯之屬。疏其壅。其逆風叫號。致傷會厭者。以養金湯之屬。清其音。其暴嗽失音者。杏仁桑皮湯。久欬失音者。蛤蚧散。若由陰虛勞嗽。聲啞者。相火爍金也。百合固金湯。去元參。桔梗。加五味。訶子。或扶羸湯。去秦艽。其內奪而厥。爲瘖。非者。腎虛也。地黃飲子。其中風症。舌瘖不

能言者音如故而舌不掉也。虛者六君湯加竹茹薑汁。實者大秦芩湯仍宜加減。其總治氣血虛燥喉音不清者。清音湯加減訶子湯脂蜜膏方。此失音症治大約潤肺滋腎之品為宜也。

醫通曰失音大都不越於肺。須分暴瘖久瘖。暴瘖多是寒包熱邪。

宜辛涼和解。消風散用薑汁沖服。肺虛傷風喘欬聲嘶。千金酥蜜膏。火邪傷肺咽

痛聲啞。生豚散合六味丸或猪脂白蜜熬膏挑服。久病失音氣虛挾痰宜滋肺腎之化

源。生豚散下都氣丸。咽乾聲槁潤肺為主。生豚散加玉竹。若不應。生豚散童真丸。

景岳全書因陣載秘方。竹葉麥冬湯。治勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服

此神效竹衣。鮮者一錢。竹茹。三錢。麥冬。二錢。竹葉片。十四片。甘草。五錢。橘紅。五錢。茯苓。

桔梗。各一錢。杏仁。七粒。竹瀝。一錢。煎七分竹瀝和勻服。

徐靈胎指南批本曰諸症失音皆有可愈之理。惟用麥冬五味熟地桂枝等藥補住肺中痰火。以致失音。則百無一生。又云久嗽失音。必由藥誤。麥冬。是失音之靈丹也。服之久。無不失音者。倘風寒痰火。偶爾失音。即不治亦愈。但更加以麥冬五味。則弄假成真矣。

附方

麻杏石甘湯 麻杏石草

蘇子降氣湯 蘇子 橘紅 半夏 當歸 前胡 肉桂 厚樸 炙草 一方有沈香無肉桂

麥門冬湯 見一卷燥

桔干湯 荆防翹 桔 牛蒡 射干 元參 山豆根 竹葉 甘草

養金湯 生地 桑皮 杏仁 阿膠 知母 沙參 白蜜 麥冬 水煎

瘖暴

杏仁桑皮湯

杏仁鹽汁

桑皮 五味
白蜜 砂糖

款久

蛤蚧散

見本卷肺痿

三肺補

百合固金湯

二、合地

歸芍

勞亞

秦艽扶羸湯

柴胡
骨皮

薑棗

永新

痲瘡

地黃飲子

見一卷中風

風臣

六君子湯

見一卷中風

風亞

大秦苜蓿湯

見一卷中風

燥虛

清音湯

人乳參苓

牛乳

梨汁

降清

訶子湯

訶子

嗽勞氣補清補清肺潤邪散病咽

脂蜜膏

猪脂 白蜜

消風散

參 苓 陳 草 荆 防 羌 芎 藿香

千金酥蜜膏

真酥 仁 麋肉 崖蜜 節糖 薑汁 生百部汁 杏

生脉散

人參 五味 麥冬

六味丸

見一卷中風

都氣丸

六味丸加 五味

童真丸

秋石 貝母 紅棗肉為丸 薄荷湯下

失音

某 肺受冬溫蘊而成熱脉洪搏指痰阻喉癢嗆欬失音與苦辛
泄降痰火清音自出所謂金空則鳴也用杏仁桑皮薑皮川貝
麥冬橘紅竹葉三服嗆嗽平惟溺赤間有寒熱前方加香豉梔
皮赤苓燈心二服寒熱除膈間覺燥去桑皮香豉加白蜜三匙
和服二劑音漸復

族弟怯症嗽久吐血曾用熟地黃阿膠淡秋石燕窩等藥獲愈經
十數載至今秋寒熱宵嗽勞則喉痛欲裂氣急聲啞呼吸有音
氣不歸源實水虧火炎金畏火灼重症古云金碎不鳴務滋腎
陰俾金水相涵翼龍燄稍熄而已做大補元煎熟地黃八錢山藥

白芍百合

各三錢

牛膝

蒸

五味

焙各八分

洋參棗仁阿膠

水貝母

各三錢

龜板

炙

女貞子

各三錢

三十劑後精神稍復兼服人乳數月喜其

胃納頗健調理如法可望延年

族子因驚遺泄喘嗽聲啞繼乃寒熱喉痛梗礙妨食口乾脉細數

醫與清金降火屢服不效予謂水涸於下火炎於上心腎諸脉

挾咽循喉既非肺痺梅核無清肺降痰之理宜滋填鎮攝俾龍

蟄伏潛喉痛息寒熱漸止方用熟地

四錢

山藥龍齒杞子

炭

天冬

元參女貞子

各二錢

茯神

三錢

丹皮栢子仁

各八分

五味

四分

淡萊

三錢煎

服甚適時用白蜜及猪膚湯潤喉喉痛寒熱若失若精關固

月餘不泄即用原方去元參加牡蠣蓮子煉蜜丸竹葉湯下庶

望音復後將煎劑去淡菜加龜甲心石斛淡秋石煎丸並服漸效乃誤信喉科鐵烙喉大痛暈絕遂成不救惜夫

王氏室女久嗽失音呼吸痰響勞則發熱頰紅乾飯稍納粥入隨出肺氣旣失肅降痰火升逆擾及中宮胃土運納不安然胃虛穀少脉來微數非降火滌痰所得效治以平氣降逆兼培胃氣倘痰火一清聲音可出海浮石蘇子貝母前胡茯苓山藥炙草薑汁竹瀝和服呼吸利痰嗽平再去前胡加訶子蛤粉數服哮喘止而音漸復

哮症論治

哮者氣爲痰阻。呼吸有聲。喉若拽鋸。甚則喘欬。不能卧息。症由痰熱內鬱。風寒外束。初失表散。邪留肺絡。宿根積久。隨感輒發。或貪涼露。臥喘嗜甜鹹膠痰。與陽氣併於膈中。不得洩越。熱壅氣逆。故聲粗爲哮。須避風寒。節厚味。審其新久虛實而治之。大率新病多實。久病多虛。喉如鼾聲者虛。如水雞者實。遇風寒而發者爲冷哮。爲實傷暑熱而發者爲熱哮。爲虛其鹽哮。酒哮。糖哮。皆虛哮也。冷哮有二。一則中外皆寒。宜溫肺以劫寒痰。並以三建膏護肺俞穴。一則寒包熱。宜散寒以解鬱熱。麻黃湯越婢加半夏湯。如邪滯於肺。欬兼喘者。六安煎加細辛。蘇葉。冬感寒邪甚者。華蓋散。三拗湯。外感寒內兼微火者。黃芩半夏湯。

熱哮當暑月火盛痰喘者。桑白皮湯或白虎湯加芩枳栝薑稍。痰壅氣急者。四磨飲

氣湯。氣降痰自清。痰多者吐之勿純用涼藥須帶辛散。小青龙湯探吐。腎哮火急

者勿驟用苦寒宜溫叔之。用椒目五六錢研細分二三次薑湯調服。侯哮止後因痰因

火治之治實哮。用百部炙草各二錢栝梗三錢半夏治虛哮。用麥

兩桔梗三錢甘草。陳皮各一錢茯苓一錢半。二服可愈。熱哮加元參。三錢鹽哮

二錢。一服可愈。此煎劑內冷哮加乾薑。錢。熱哮加元參。三錢鹽哮

加飴糖。三錢。酒哮加柞木。三錢。糖哮加佩蘭。三錢。再用海螵蛸。大人五錢

小兒二錢。黑砂糖拌。其遇厚味而發者。清金丹。消其食積傷鹹冷飲

食而發者。白麴二錢砂糖二錢飴糖化汁捻作餅。年幼體虛者分

三四次服吐後用。異功散。脾胃陽微者急養正。四君子湯。久發中虛者

急補中。益氣湯。宿哮沈痼者攝腎真。腎氣丸。總之哮既發主散邪哮

定則扶正爲主也

附方

冷哮

溫肺湯

見本卷欬嗽

溫肺

鍾乳丸

鍾乳石甘草湯煮研
炙草蜜丸

麻黃醋湯泡焙乾 杏仁

溫肺

冷哮丸

牙皂 麻杏 辛草 星夏 川烏 川椒 白礬

外治

三建膏

天雄 川烏 川附 桂心 官桂 桂枝 細辛
川椒 乾薑各二兩 麻油熬加黃丹攤貼肺俞

散邪

麻黃湯

麻桂 杏草

散寒

越婢加半夏湯

見本卷欬嗽

痰嗽

六安煎

見本卷欬嗽

利疏

華蓋散

見本卷欬嗽

疏解清熱降火降火降逆降逆降逆探吐厚味脾虛補中

三拗湯

麻黃不去節 杏仁 甘草 薑

黃芩半夏湯

白芍 半夏 甘草各二錢 黃芩三錢 棗

桑白皮湯

芩 連 杏 貝 梔 夏 桑皮 蘇子 薑

白虎湯

見一卷中風

四磨飲

人參 沈香 檳榔 烏藥 等分磨汁煎服

蘇子降氣湯

見本卷失音

小青龍湯

見本卷欬嗽

清金丹

蘿蔔子蒸晒一兩 牙皂燒存性三錢 薑汁爲丸

異功散

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

攝腎

腎氣丸

見本卷虛損

哮

包

哮症每十日一發嗽痰夜甚脉形俱屬虛寒乃用六味滋陰
治不對症焉能奏效議補益中氣爲虛哮治法用潞參山藥茯
苓半夏炙草於朮炒杏仁煨薑數服而效

一小兒冬春久哮屢服治風痰之劑不應診其脉知爲脾弱不能
化乳濕用四君子湯加薏苡山藥穀芽俱炒製半夏數服愈

湯氏宿哮秋發欬嘔氣急暑濕爲新涼所遏宜辛平解散用橘皮
半夏湯加桔梗象貝杏仁茯苓枳壳香薷生薑數服而平

王丹溪治哮專主痰每用吐法不用涼劑謂寒包熱也今弱冠
已抱宿根長夏必發呼吸短促欬則汗洩不能平卧脉虛左尺

搏大不任探吐乃勞力所傷暫與平氣疏痰俟哮喘欬定當收攝
真元先服桑白皮湯去苓連梔夏用桑白皮蜜炙甜杏仁炒研茯神
竹茹貝母蘇子炒研薄橘紅數劑後服生脉散潞參五味麥冬加
海浮石海螵蛸遠志肉山藥炙草茯苓

巫婦梅夏宿哮喘屢發痰多喘欬顯係濕痰鬱熱為寒邪所遏暫用

加減麻黃湯溫散麻黃三分桂枝五分杏仁二錢蘇葉半夏製各錢半橘紅

一錢桔梗八分薑汁三匙二服後隨用降氣疏痰栝萸皮桑皮俱炒貝

母杏仁俱炒研各二錢海浮石三錢前胡枳壳各八分蘇子炒研六分茯苓二錢薑

汁三匙數服哮喘除

喘症論治 短氣 少氣 逆氣附

肺爲氣之主。腎爲氣之根。肺主出氣。腎主納氣。陰陽相交。呼吸乃和。若出納升降失常。斯喘作焉。張口擡肩。氣道奔迫。病機謂諸病喘滿。皆屬於熱。海藏以爲火鑠真氣。氣衰而喘。有由然矣。夫喘分虛實。經云。邪入六腑。則身熱不時臥上爲喘呼。又云。不得卧。卧則喘者。水氣客之。此舉喘之實也。經曰。秋脉不及。謂肺金則令人喘。呼吸少氣。又曰。勞則喘息汗出。此明喘之虛也。實喘者。氣長而有餘。虛喘者。息促而不足。實喘者。胸滿聲粗。客邪干肺。上焦氣壅。治宜疏利。通定。虛喘者。呼長吸短。腎不納氣。孤陽無根。治宜攝固。六味丸去丹滲加牛膝。五味子補骨脂胡桃肉。故實喘責在肺。虛喘責在腎。葉氏亦云。喘

症之因在肺為實。在腎為虛也。徐靈胎指南批本云。喘在肺為實。

但疑似間。極難辨認。香巖先生又以出氣不爽為肺病。入氣有音為腎病。更為明確矣。治喘者。凡肺竅壅塞。

呼吸不利。氣盛脈實。滑數有力。皆實候也。如肺感風寒致喘。三拗湯。

蓋肺熱痰火作喘。麻杏甘膏湯。肺寒飲邪喘逆。桂枝加散。香薷飲。因濕邪濁逆而喘。四苓散。加杏撲。肺氣不降。浮腫發喘。

喘。白虎湯。桑皮通草。葶藶。肺氣不降。浮腫發喘。

麻黃湯。去桂枝。加桑皮。薏仁。茯苓。肺脹水停。上氣喘欬。脈沉。小青龍加石膏湯。水

病喘滿。腎邪犯肺。宜通陽泄濁。真武湯合四苓散。去白朮。痰喘必滌其源。氣鬱。

溫膽湯。火動生痰。清膈煎。怒喘兼平其氣。四七湯。如吸音頗促。勞動則劇。氣弱脉

微。或浮大而弦。按仍如無。察其外無客邪。內無實熱。皆虛候也。如

肺虛金燥。生脉散。胃虛陽升。人參五味湯。腎陰虧而精傷。衝任經虛。

丹田火熾。肺金受燥。大劑六味湯。加麥冬五味。腎陽虛而氣脫。孤陽浮越而赤。

煩躁火不歸元。七味地黃丸。加人參麥冬。腎不納氣。身動卽喘。陰陽樞紐失交。

急須鎮攝。腎氣湯。從陰引陽。都氣丸。從陽引陰。腎與肺胃俱虛。喘。

嗽乏力。人參一錢。胡桃三枚。連皮蜜炙煎服效。病後氣喘爲肺虛。生脉散加阿膠白朮陳皮。病後。

氣促嗽痰而浮足冷。爲陽虛。八味丸。產後喘爲孤陽絕陰。最危。因營。

氣暴竭。衛氣無依。獨聚肺中。故喘急。獨參湯灌之。若血入肺。面赤喘欲。

死。參蘇餘。如敗血衝心。胸滿上氣。逐其敗血。喘自定。血竭散。老人久病。

喘嗽不得卧。杏仁丸。動卽作喘。多由虛衰。宜嵩崖脾腎丸。陰虛宜滋養。熟地黃肉。

五味。阿膠。杞子。陽虛宜溫養。參耆歸朮茯苓。蓮子。山藥。炙草。陰陽不交。攝納下元。

海參膠。淡菜膠。熟地。茯苓。牛膝。遠志。骨脂。青鹽。石莢。以此分症施治。朗若列眉已。

短氣呼吸促而不能續似喘而無痰聲其症有二一屬痰飲金匱云

短氣有微飲當從小便去之

苓桂朮甘湯主之

蓋呼氣短

用苓桂朮

湯以通其陽陽氣通則小便能出矣吸氣短

用腎氣湯

以化其陰腎

氣化則小便之關門利矣一屬氣虛東垣云肺主諸氣短氣者

五臟之氣皆不足而陽道不行也氣短小便利者

四君湯去茯苓加黃耆

如腹中氣不轉者

倍甘草

肺氣短促

倍人參加白芍

使肝膽之邪不敢犯

之若失血後陰火上乘短氣不足以息或腎虛發熱唾痰者

生脉

散加當歸黃芪生地

少氣少不足以言經云怯然少氣是水道不行形氣消索也又曰

言而微終日及復言者此奪氣也又曰脾脉搏堅而長其色黃

當病少氣。

獨參湯。生脉散。保元湯。異功散。

逆氣

上逆不得卧。而息有音。經曰。胃者六腑之海。其氣下行。陽明

脉逆。不得從其道。故不得卧。而息有音也。起居如故。而息有音

者。肺之絡脉逆也。絡脉不得隨經上下。故留經而不行。絡脉之

病人也。微。故起居如故。而息有音也。其不得卧。卧則喘者。是水

氣之客也。水者。循津液而流。腎爲水臟。主津液。主卧與喘也。治

陽明之氣逆。

四磨湯。七氣湯。

治肺絡之氣逆。

杏子湯。小青龍湯。越婢湯。蘇子降氣湯。

治腎

氣之逆。

麻黃附子細辛湯。腎氣湯。靈砂丹。

經曰。寸口脉實者。肺實也。肺必脹。上氣喘逆。咽中塞。如嘔狀。自汗。

皆肺實之候。右寸脉虛者。肺虛也。必咽乾。無津。少氣。不足以息。

醫通曰肺虛受寒而喘

參蘇湯肺湯

寒鬱熱邪而喘中有熱痰遇冷即

發麻黃定喘湯

遠年欬逆上氣胸滿痞塞聲不出者

人參定喘湯

虛冷上氣

勞乏喘嗽

千金用半夏人參薑桂心甘草煎服

上氣不得卧

生薑人參橘紅紫蘇肥各一錢五味數粒

盛多痰喘不能卧元氣未衰者

干縉湯或合導痰湯

經年喘嗽遇寒更甚者

九寶湯安嗽化痰膏

喘嗽氣從臍下衝上尺脉洪數兼盜汗潮熱屬陰虛

湯加補骨脂五味送靈砂丹

凡衰病產後喘促者均為少氣雖素有痰火亦由氣虛

須大劑若生脉散

虛而欲脫元海根搖火從臍下逆衝而上似喘非喘吞若不及急

須峻補鎮攝丹田

大劑六味湯加五味牛膝青鉛元武甲心慈石

喘與脹二症相因皆小便不利故喘則脹脹必喘先喘後脹者治

在肺先脹後喘者治在肺經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由肺氣降下而輸化也若肺受邪則失降下之令以致水溢皮膚而生腫滿此喘爲本腫爲標治宜清金降氣爲主而行水次之如脾主肌肉惡濕克水若脾虛不能制水則水濕妄行外侵肌肉內壅滯上使肺氣不得下降而喘乃生此腫爲本喘爲標當實脾行水爲主而清金次之若肺病而用燥脾之藥則金得燥而愈喘脾病而用清金之藥則脾得寒而益脹矣

喘症脉候

喘脉宜浮遲不宜急疾喘逆上氣不得卧者死上氣面目腫肩息

脉浮大者危。上氣喘息低昂。脉滑手足溫者生。脉濇肢寒者死。右寸沈實而緊。爲肺感寒邪。亦有六部俱伏者。宜發散則喘定。

附 方

定喘湯 麻杏芩夏草白果款冬蘇子

六味丸 見一卷中風

三拗湯 見本卷哮喘

華蓋散 見本卷欬嗽

麻杏石甘湯 麻杏石草

桂枝加撲杏湯 桂芍薑草樸杏

香薷飲 見一卷中風

通治補攝發散解利痰火飲邪暑陽

暑 喝 利 濕 散 邪 肺 脹 水 停 水 逆 氣 痰 火 痰 怒 喘 肺 虛

白虎湯 見一卷中風

四苓散 見一卷溫

麻黃湯 麻 桂 杏 草

小青龍加石膏湯 小青龍見本卷欬嗽此加 石膏

越婢加半夏湯 見本卷欬嗽

真武湯 朮 附 苓 芍 薑

溫膽湯 見一卷溫

清膈煎 廣皮錢半 貝母 浮石各一錢 膽星一錢

三因四七湯 木通錢半 白芥子七分 夏 蘇 樸 薑 棗

生脉散 參 味 麥冬

胃虛引火納氣產喘敗血老人虛衰支飲少氣少氣

人參五味湯參 朮 廣皮各一錢 五味九粒 麥冬 杏仁各八分 薑三片 棗二枚

七味八味丸見一卷中風 氣丸 八味丸加 牛膝 車前名腎

都氣丸六味丸加 五味子

參蘇飲人參一兩 蘇木二兩

血竭散血竭 沒藥各一錢 以陳酒 童便各半煎沸調

杏仁丸杏仁 核桃肉 蜜丸

嵩崖脾腎丸腎氣丸 加骨脂 益智 砂仁

苓桂朮甘湯苓 桂 朮 草

保元湯見一卷火

異功散見一卷中風

逆氣

四磨湯 見本卷哮喘

逆氣

七氣湯 參 桂 夏 草 薑

逆氣

杏子湯 麻 桂 杏 芍 薑 天冬

降氣

蘇子降氣湯 見本卷失音

腎氣

麻黃附子細辛湯 麻 附 辛

氣

靈砂丹 水銀 硫黃 二味炒成砂子入水火鼎煅煉為末

肺

參蘇溫肺湯 參 苓 芫 草 桂 夏 陳 蘇 味

寒

麻黃定喘湯 即前定喘湯

熱

人參定喘湯 人參 麻黃 炙草 阿膠 半夏各一錢

久咳

干縉湯 半夏 七粒 桑皮 各五分 栗壳 二分 薑 三片

喘嗽 痰膠

導痰湯

見一卷中風

九寶湯

麻皮

杏

蘇

桂

陳

荷

薑

草

桑皮

安嗽化痰膏

見本卷欬嗽

喘

趙

衰年喘嗽痰紅舌焦咽燥背寒耳鳴頰赤脉左弦疾右浮洪而尺搏指按脉症係冬陽不潛金爲火燥背覺寒者非真寒也以父子懸壺忽而桂附忽而知藥忽而葶藶逐水忽而款冬泄肺致嗽血益加身動卽喘坐則張口擡肩卧則體側喘劇因側卧則肺系緩而痰益壅也思桂附旣辛熱助火知藥亦苦寒化燥非水焉用葶藶泄熱何藉款冬細察吸氣頗促治宜攝納但熱蒸膩痰氣衝咽痛急則治標理先清降用川百合貝母杏仁麥冬沙參牡蠣阿膠水化燕窩湯煎一啜嗽定而痰紅止去杏仁牡蠣阿膠加生地竹茹丹皮元參羚羊角午服以清上中浮游

之火用熟地五味茯苓神秋石龜板牛膝青鉛晚服以鎮納下焦散越之氣脉症漸平

族某七旬以來冒寒奔馳欬嘔喘急脉弦滑時愛冷氣夫寒痰停腕必嘔宿痰阻氣必欬老人元海根微不任勞動勞則嗽嗽則氣升而喘必靜攝爲宜倣溫肺湯用辛溫止嗽以定喘淡乾薑五味乾薑五味攝太陽而定喘桑皮炙茯苓潞參甜杏仁橘紅古人治嗽喘必二味同用製半夏款冬花紫衣胡桃數服喘嘔俱定十服全瘳

李喘由外感者治肺由內傷者治腎以肺主出氣腎主納氣也出氣阻而喘爲肺病吸氣促而喘爲腎病今上氣喘急遇煩勞則發不得卧息必起坐伏案乃定近則行步亦喘是元海不司

收納之權致膠痰易阻升降之機急急攝固真元熟地炭牛膝
炭茯神五味萸肉補骨脂蓮子俱炒數服頗安

貢 積年痰嗽脉細形衰動則疝氣偏墜病因肝腎久損客冬心
事操勞身動卽喘痰嗽益劇肉銷骨立是五液悉化爲痰偏卧
不舒是陰陽亦乖於用所謂因虛致病積損成癆候也右脉沈
數無力左脉浮數無根良由下元真氣失納以致下引上急吸
入頗促而爲短氣若不納使歸源將下元根蒂都浮喘嗽易由
鎮靜况症本腎虛水泛爲痰必非理嗽滌飲可效奈何膽星竺
黃芥子芩蘗等無理亂投不知顧忌昨議服攝固之品痰氣較
平而脉象未改是損極難復維繫不固有暴脫之憂今酌定晨

服都氣丸加參朮遠志故紙晚服腎氣湯去萸泄丹皮桂附加
茯神五味杞子沙苑子蓮子棗仁冀其氣平而痰嗽自定

岳

少年體質陰虧兼傷煩勞脉虛促熱渴頰紅痰血喘急速進

糜粥以扶胃食頃喘定症宜清調肺衛潤補心營甜杏仁阿膠

水沙參川貝茯神棗仁麥冬石斛萸仁黃耆

蜜炒

三服脉勻症退

繼進燕窩湯嗽喘悉止治以培土生金潞參山藥炙草玉竹五
味茯神杏仁蓮子紅棗食進丸用加減都氣而安

服姪初春脉左弦長直上直下喘嗽吐紅夢泄冬陽不潛足少陰
經與衝脉同絡陰虛火炎氣衝爲喘絡傷爲血乃元海根蒂失
固醫者不知納氣歸原泛用歸耆朮草症勢加劇寒熱欬逆血

升氣促衝脉動諸脉皆動總由肺腎失交急急收納務令陽潛

陰攝阿膠水化牡蠣醋煅龜板酥炙龍骨煅五味山藥高麗參茯苓

仁坎燕焙研數服嗽平血止去坎燕加青鉛衝氣亦定

倪年近七旬木火體質秋嗽上氣喘急痰深而黃甚則不得卧

息須防暈厥治先平氣定喘蜜桑皮蘇子杏仁川貝母茯苓

薏百合二服後加白芍麥冬述舊服兩儀膏痰多食減今訂膠

方減用熟地只用四兩砂仁末拌蒸晒乾高麗參一兩茯苓三兩甜杏仁炒研蓮

子八兩棗仁一兩枇杷膏四兩燕窩兩橘紅八錢貝母一兩山藥三兩阿膠一兩

各味熬汁阿膠收開水化服

某腎不納氣則喘息上奔脾不輸精則痰氣凝滯今痰哮不利

呼吸頗促病本在脾腎而肺胃其標也由冬延春脉候若斷若續忽神煩不寐語譫舌灰虛中挾溫治先清降杏仁栝蒌象貝茯苓潞參菖蒲汁冲服一劑嗽定得寐舌胎稍退進粳米粥喘息仍盛脉見虛促急用納氣歸原冀根蒂漸固高麗參五味牛膝炭遠志茯神杞子蓮子牡蠣粉六服間用七味地黃丸而安

痰飲論治

痰飲皆津液所化。痰濁飲清。痰因於火。飲因於濕也。痰生於脾。濕勝則精微不運。從而凝結。或壅肺竅。或流經隧。飲聚於胃。寒留則水液不行。從而泛濫。或停心下。或漬腸間。此由脾胃水濕陰凝。必陽氣健運。則濁陰下降。如烈日當空。則烟雲消散。宜以理脾逐濕。爲治者也。若夫腎陽虛。火不制水。水泛爲痰。爲飲。逆上攻。故清而澈。治宜通陽洩濕。忌用膩品助陰。如四物六味等湯。腎陰虛。火必燦金。火結爲痰。爲痰火上升。故稠而濁。治宜滋陰清潤。忌用溫品助燥。如陳六君等湯。治法所必辨也。夫清澈爲飲。稠濁爲痰。飲惟停蓄腸胃。而痰則隨氣升降。遍身皆到。羅氏云。天下無逆流之水。因乎風也。人身無倒上之痰。因乎氣也。在肺

則欬在胃則嘔。在心則悸。在頭則眩。在背則冷。在胸則痞。在脇則脹。在腸則瀉。在經絡則腫。在四肢則痺。變幻百端。昔人所謂怪症。多屬痰。暴病多屬火也。然又謂見痰休治痰者。以治必探本。恐端事消滌重虛。其胃氣反滋。膨脹耳。丹溪云。胃氣亦賴痰以養。亦有但治其痰者。如風痰散之。防風丸。加南星。生薑。寒痰溫之。理中丸。暑痰豁之。消暑濕痰燥之。二朮二陳。燥痰潤之。潤肺飲。加火痰清之。清氣化痰。食痰消之。保和丸。酒痰化之。瑞竹堂鬱痰解之。三因湯。加鬱金。氣痰利之。咯不出。嚥不下。如敗絮。驚痰世之。控涎丹。加菖蒲。香附。如海石。海粉。芒硝。瓦楞。頑痰吐之。三聖散。青綠丸。虛在上者。涌之。或稀涎散。在下者。導之。導痰湯。甚在脾者。黃滑而易出。

二陳湯。在肺者白如米粒。澀而難出。利金湯。去薑枳。在肝者青而加枳朮。

在肺者白如米粒。澀而難出。

在肝者青而

多泡。川芎丸加星枳。在心者赤結如膠粘。半黃丸。在腎者黑而多鹹。

在心者赤結如膠粘。

在腎者黑而多臍。

留脇下者天陰隱痛。二陳湯加白芥子。滯經絡者筋骨牽痛。薊

留脇下者天陰隱痛。

加滯經絡者筋骨牽痛。

竹甌薑汁行之。或入四肢者手足疲軟。導痰湯加桂枝薑黃竹甌隱皮裏膜外

入四肢者手足疲軟

導痰湯加桂枝薑黃竹瀝隱皮裏膜外

者腫而麻木。二陳湯加白芥子。薑汁竹瀝。或成塊流走不定。導痰湯加薑汁竹瀝。或成核。

二陳湯加白芥子。薑汁竹瀝。

或成塊流走不定

薑汁竹瀝或成核

結聚頂間。痰核丸。膈上停痰痞悶。小陷胸湯。加茯苓。枳實薤白竹茹。皖中伏痰臂

痰核丸
上停痰痞悶

小陷胸湯加茯苓枳實薑汁竹瀝

皖中伏痰臂

痛。指迷茯苓丸。痰滯氣逆嗽多。六安煎。寒涎沃膽不眠。溫膽湯。多驚者加蠟尾。痰挾。

痰滯氣逆嗽多煎六安

寒涎沃臍不眠者溫臍湯多驚者加蠍尾。

痰挾

死血攻注。控涎丹。加韭汁。桃仁。痰結窠囊嘔吐。薑汁。竹瀝。中風痰。

控涎丹加韭汁桃仁

痰結窠囊嘔吐

薑汁竹瀝
非汁飲。

中風痰

迷心竅。屬寒者，滌痰湯下牛黃。
屬熱者，下二丹丸。
癩癰痰悶抽掣。牛黃此皆治其標。

屬寒者瀉痰湯下牛黃丸
屬熱者下二丹丸

癰瘤痰悶抽掣

此皆治其標

也如求其本脾虛濕痰宜健脾以運之四君湯參朮健脾丸肺熱火痰宜清

四君湯參
龍健脾丸
肺熱火痰宜清

肺以潤之。清肺飲。四陰煎。脾肺氣虛不運生痰者。六君湯。六君湯。肺胃氣虛不化。

生痰者。六君湯。加桔梗。脾氣滯者。異功散。加砂仁。中氣弱者。補中益。脾胃虛挾濕。

者。脉濡緩。痰清稀。六君湯。加肝腎虛痰中見血者。六味湯。加烏鰂。炮薑。補中湯。加茯苓。半夏。

腎陰虧。火動痰升者。五味天冬。相火燥痰津涸者。滋陰清。腎陽衰。

水泛為痰者。薛氏八味丸。如勞損欬白痰。俗名白血者。補肺。此乃。

治痰之本矣。且痰飲同稱而殊治。豈可混乎。試由痰論飲。內經有

飲無痰。其論飲病皆由濕淫土鬱至金匱乃立痰飲懸飲溢飲支

飲留飲伏飲等名。皆水停為患。如其人昔肥今瘦。水走腸間。漉漉

有聲為痰飲。必目眩短氣。飲在陽則呼氣短。苓桂朮甘湯。飲在陰。

飲當從小便利之。苓桂。飲後水流脇下。欬唾引痛為懸飲。脉必沈。尤甘湯。腎氣丸主之。

弦十棗湯。飲水流於四肢。當汗不汗。身體疼重。為溢飲。小青龍湯。欬逆倚

息。短氣不得臥。形如腫。為支飲。葶藶瀉肺湯。水停心下。背寒冷如

掌。大短氣。肢節痛。脇痛。引缺盆。脈流為留飲。導痰湯。滿喘欬嘔吐。

寒熱。腰背痛。身振。瞶為伏飲。倍朮丸。加痰飲不渴。小半夏湯。支飲眩目。

澤瀉湯。心下痞。膈間有水。悸眩。小半夏湯。茶飲過多成癖。及飲酒成

癖。薑桂飲。癖嘔酸餽。雜心懸如飢。三聖丸。別有非痰非飲。吐清涎。

沫者。脾虛不能收攝也。六君湯。加渴欲飲水。水入即吐者。名水逆。

五苓散。大法外飲治脾內飲治腎。治脾茶桂朮甘湯。氣壅者開之。小青龍湯。

去麻。倉欬者平之。鮮枇杷葉杏仁茯苓前胡蘇子桑皮湯。逆者溫之。真武湯。陽微者和

之。外臺茯苓散。濕滯者滲之。五苓散。留伏者逐之。桂苓湯。支結入絡者通之。

茯苓桂枝湯加參草。飲症通治。五飲仲景云。治痰飲當以溫藥和之。此可謂一言提要者矣。

仲景曰。飲而兼欬者。但治飲。不必治欬。

繆仲淳曰。生痰之源。不一。治各不同。由陰虛火炎上迫乎肺。凝結

為痰。是謂陰虛痰。火痰在肺。而本於腎。治宜降氣清熱。益陰滋水。

忌辛溫燥由脾胃寒濕生痰。或飲啖過度。致脾氣壅滯。為痰。此病

在脾胃。無關肺腎。治宜燥脾利氣。忌滯膩寒由風寒鬱熱生痰。病

亦在肺。治宜豁痰清利。中佐以辛溫。忌濕潤藥由風寒鬱熱生痰。病

藥無格拒之患。夫痰質稠粘。飲惟清水。或青綠苦酸。多因過飲茶

酒。或情抱抑鬱。中寒濕阻。治宜燥濕利水。溫通陽氣以行之。二陳

五苓

黃武之屬

張路玉曰。痰飲變生諸症。必以治飲爲先。諸症自愈。如頭風。肩稜。骨痛。屢用風藥不效。投以痰劑。收功。患眼赤羞明而痛。與涼藥弗瘳。界以痰劑。獲效。凡此之類。不一而足。在審症圖機耳。如太陰痰喘治風亦此意也。

痰飲脈候

脈沈者留飲。雙弦者寒也。偏弦者飲也。肺飲不弦。但苦喘滿短氣。支飲亦喘不得卧。短氣。其脈平。沈而弦者懸飲。肝脈軟而散。色澤者溢飲。提綱曰。痰脈弦滑。三四日飲脈皆沈細弦滑。病人一臂不遂。時復移在一臂。其脈沈細。非風也。必有飲在上焦。痰得瀉。脈必費調理。以痰膠固。

脉道阻塞也。左右關脉實大而浮。膈上有稠痰也。宜吐之。病人百藥不效。關上脉伏而滑者。痰也。眼胞上下如黑煤者。亦痰也。回春曰。眼黑而行步呻吟。舉動艱難。入骨痰也。非葶藶苦參不除。其偏體骨節痛。審氣血加化痰藥。入門曰。痰厥者。因內虛受寒。痰氣阻塞。手足厥冷。麻痺暈倒。脉沈細也。

用藥

濕痰。主半夏佐風痰。主南星佐燥痰。主貝母佐火痰。主竹瀝佐寒痰。伏苓。蒼朮。能。食痰。用神麴。山。酒痰。用花粉。白朮。神驚痰。用天竺黃。牛黃。膽星。半。蘇。子。食。痰。查。麥。芽。酒。痰。麴。或。四。苓。散。神。驚。痰。半。夏。連。翹。貝。老。痰。川。海。浮。石。氣。痰。殼。鬱。金。沽。膠。痰。川。橘。紅。杏。痰。核。桔。枳。星。夏。枯。草。痰。結。海。藻。薑。汁。痰。在。四。肢。非。瀝。不。達。痰。在。脇。下。非。白。芥。不。除。痰。

在皮裏膜外非薑汁竹瀝不到痰在經絡非薑汁竹瀝不行痰中帶血

宜悲汁痰迷癰瘤宜控涎氣實痰盛宜三子養實熱老痰礞石滾

風寒痰湧及小兒驚風青州白丸痰血塞心竅癲狂白金丸實痰積飲宜

小胃降痰氣宜蘇子降氣湯海粉熱痰能清濕痰能燥堅痰能軟頑

痰能消石墮痰火極效黃芩青黛治熱痰假其下行也枳實治痰有推牆

倒壁之功五倍子治老痰元明粉治熱痰以其能降火軟堅也硝石大

能降火消痰結研細和白糖舌飴服效蒼朮治痰飲成窠囊行痰極

效

附方

風防風丸防風川芎天麻甘草蜜丸硃砂為衣

痰寒痰暑痰濕痰燥痰火痰食痰食痰酒

青州白子丸

生白附子汁為丸

生南星生半夏

川烏細辛

理中化痰丸

參朮薑草

加苓夏

消暑丸

見一卷暑

二朮二陳湯

二朮苓夏陳草

白朮丸

星夏朮為丸薑湯下

潤肺飲

二母陳苓麥桔花粉生地草薑

清氣化痰丸

杏糊太糞枳夏星陳苓苓薑汁

保和丸

查肉二兩黃連半夏神麴橘紅麥芽茯苓各一兩

栝蒌丸

糞仁半夏山查神麴糊丸

瑞竹堂化痰丸

星夏青陳杏葛蘇子查肉麥芽神麴香附薑汁

痰喘 氣喘 痰喘 驚風 老痰 頑痰 頑痰 吐痰 隔痰 涌痰 吐痰 下降

七氣湯

見本卷欬嗽

三仙丸

南星麴 半夏麴各四兩 香附二兩 糊丸

控涎丹

甘遂 大戟 白芥子 糊丸薑湯下 一名妙應

青礞石丸

礞石打碎用焰硝二兩同入瓦罐內泥封煅石色如金為度水丸 一名奪命丹

三聖散

半夏 陳皮 黃連 麴糊丸 薑湯下

青綠丸

石青一兩 石綠五錢 研飛麴糊丸萊豆大每服十丸吐痰不損人

參蘆散

參蘆二錢 或加竹瀝和服取吐虛人最宜

桔梗蘆散

桔梗蘆一二錢 研服探吐

稀涎散

見一卷中風

導痰湯

見一卷中風

百

枳壳錢半

蜜丸

見本卷端

薑汁浸蒸餅爲丸

蜜丸

新
經

芥

白果 南星

柳巷

伏痰痰嗽膽虛痰迷痰癰 熱痰健脾補脾潤燥

指迷茯苓丸

半夏麴二兩 硝二錢半

茯苓一兩 薑汁糊丸

枳壳五錢 薑湯下

風化

六安煎

見本卷欬嗽

溫膽湯

見一卷溫

滌痰湯

見一卷中風

牛黃丸

膽星 礞石

全蠍 防風

蟬蛻各二錢半 天麻各錢半

麝香五分

白附子 煑棗肉

水銀 爲丸

二丹丸

丹參 各一兩

熟地 丹砂

天冬各兩半 人參

麥冬

茯神

甘草

四君六君湯

見一卷中風

參朮健脾丸

歸參 芍 芎

朮 草 薑 棗

陳名異功散

此再加

清肺飲

見本卷欬嗽

清肺補中痰血火升痰嗽相火陽衰勞嗽痰飲逐飲

四陰煎 生地 麥冬 白芍 百合 沙參 貝母 阿膠 各二錢 茯苓 花粉 各錢半 生甘草五分

補中益氣湯 見一卷中風

六味丸八味丸 見一卷中風 薛氏八味丸以茯苓為君

五味天冬丸 天冬 五味 搗丸

百花膏 百合 款冬 蜜丸 加紫苑 百部 烏梅 名

滋陰清化丸 二冬 二地 二母 苓 味 草 花粉 山藥 蜜丸

真武湯 朮 附 苓 芍 薑

補肺湯 參 耆 五味 紫苑

苓桂朮甘湯 苓 桂 朮 草

腎氣丸 即八味丸加 牛膝 車前

懸飲 十棗湯 芫花 甘遂 大戟 大棗

盜飲 小青龍湯 見本卷欬嗽

支飲 葶藶瀉肺湯 葶藶 大棗

泄飲 五苓散 見一卷溫

濕伏飲 倍朮丸 白朮 桂心 乾薑 蜜丸

痰飲 小半夏湯 半夏 生薑

支飲 澤瀉湯 澤瀉 白朮

悸眩飲 小半夏加茯苓湯 夏 苓 薑

飲癖 薑桂丸 南星 半夏 肉桂

飲癖 三聖丸 卽前三聖散

嘔酸

蒼朮丸

蒼朮 桑葉為丸

和陽

外臺茯苓飲

見一卷中風

留飲

桂苓湯

茯苓四錢 桂枝 白朮各三錢 甘草一錢

通絡

茯苓桂枝湯

苓 桂 芍 草 薑 棗

通治

五飲湯

參 朮 橘 枳 夏 樸 桂 芍 澤 草

痰逆

三子養親湯

蘇子 白芥子 蘿蔔子

痰血

白金丸

白礬三兩 鬱金七兩 薄荷糊丸

逐水

小胃丹

芫花 甘遂 大戟 大黃 黃蘗 以白朮膏丸

降痰

蘇子降氣湯

見本卷失音

熱痰

潤下丸

半夏二兩 南星 炙草 黃連 黃芩各一兩 橘紅半觔鹽水製 蒸餅為丸

痰飲

朱 氣逆濁飲上升甚則中夜起坐醫用二陳兼旋覆代赭湯不應診脉乃陽微濁逆用外臺茯苓飲加乾薑沈香汁愈

姪 脉沈弦爲停飲由脾陽不運輸水濕留胃故食後清稀宿水傾吐而出按仲景論飲邪當以溫藥和之金匱治痰飲胸脇支滿苓桂朮甘湯主之今倣其法而更其製以茯苓泄水桂枝通陽白朮燥濕甘草和中加砂仁半夏枳壳蘇子運脾以降濁研末服薑湯下積飲遂除

貢 飲症吐青綠苦沫乃膽氣所溢用溫膽湯加吳萸乾薑蒼朮逐濕滌飲吐止嗣用蒼朮陳散加益智仁焦朮粳米共爲末

薑湯調服溫理脾陽而安

丁 積年痰飲脉虛右尺大宿痼因勞力中虛而發用六君子湯加薏苡煨薑椒目服效

貢 痰飲久嗽清晨濁沫上干必傾欬吐出膈上乃寬此由宿食化痰起胃虛隨氣上升故也然細參症脉必腎中陽虛仲景所謂腎虛水泛爲痰以腎氣丸補而逐之向服崔氏八味丸雖未速效猶是對症主治惟客歲自用倒倉法洗滌停痰宿飲乃爲間道出奇王節齋明醫雜著云腸胃爲倉倉中有陳腐敗穀須倒出之腸胃中有痰血積滯須蕩滌之若病不屬腸胃不可輕用据此宜乎用之無益

王 脉沈弦始則頭痛悶嘔舌白惡食繼則氣阻脘痛攻注腰膺

隨觸輒嘔背寒心悸下利溺少九晝夜不能著枕固是濕阻氣
痺但醫者混治謬託消和不知飲邪入絡上千爲頭痛下滲爲
瀉利漬入太陽爲背寒停於心下爲悸動金匱云口乾不欲飲
水者爲飲邪未去故也今飲入支絡不用辛溫通逐痛嘔焉止
倣小半夏湯加茯苓川椒目枳壳吳萸桂枝沈香磨汁日再服痛
緩得卧糜粥得下背寒心悸俱却惟臍腹痞結時嘔時痛乃支
絡濁滯未淨改用通絡導滯歸鬚小茴香生查肉橘核青鹽山
井炒
梔薑汁
炒茯苓枳壳降香末痛嘔悉平改用和中運濕製半夏砂
仁茯苓炙草穀芽大豆黃卷薏苡陳皮全瘳

血症總論

稟水穀之精華出於中焦以調和五臟。滌陳六腑者血也。生化於脾。宣布於肺。統於心。藏於肝。化精於腎。灌輸百脉。其清而純者爲守臟之血。清中之濁者爲腑絡之血。清中之清者爲營經之血。皆有氣以護之。膜以隔之。絡以通之。原不至上溢而下脫也。一有偏傷。或怒勞迫而上升。或陰陽虛而失守。則爲吐。爲衄。爲嘔。爲咯。爲欬。血唾。血經。所謂陽絡傷則血外溢也。或陰虛陽搏。或陽衰陰脫。或濕熱下陷。則爲崩中。爲漏下。爲溺血。爲便血。爲腸風。血痢。經所謂陰絡傷則血內溢也。更有瘀血在裏。漱水不欲嚥。小腹滿。身黃。便黑。在上則喜忘。在下則如狂。傷寒論所謂三焦畜血證也。夫血

行清道出於鼻。行濁道出於口。吐血出於胃。衄血欬血出於肺。嘔血出於肝。咯血出於心。痰涎之血出於脾。唾血出於腎。鼻血爲衄。口鼻俱出爲腦。耳血爲耳。目血爲眼。齒血爲牙。舌血爲舌。九竅俱出爲大衄。胸前一孔出血爲心漏。臍間出爲胃血。膚血爲紅汗。爲肌。衄上出如泉湧爲血溢。衝任不攝爲崩漏。由精竅出溺孔痛爲血淋。由膀胱出不痛爲溺血。色稠紅爲結陰。便血清而色鮮四射如濺爲腸風。濁而色暗爲臟毒。膿血雜痢爲腸澼。射血如線爲痔血。凡血色鮮濃者屬火。紫黑者火極。晦淡無光者陽衰。不能攝陰。粉紅者肺血。赤如硃漆光者心胞血。鮮稠濃紫者脾肝血。痰唾雜紅點紅絲者腎血。血雖少。吐多成碗成盆者胃血。胃多氣多。治最難。

血。欲知何臟之血吐在水碗中。浮者肺血。沈者肝血。半沈半浮者。心血。各隨所見。以羊肺、羊肝、羊心。煮熟。蘸白芨末。日食之。吐血服藥而血不止。乃肺上有竅也。用白芨末。以猪肺煮熟。蘸食之。日服三四次。使竅爲芨末填滿。其血自止。方名獨勝散。下注之血。血淋多。因房勞腎虛。溺血多。因氣化移熱。便後血爲遠血。由腸胃來。便前血爲近血。由肛門出。濺射者風淫。點滴者濕著。血下行爲順。其治易。上行爲逆。其治難。得寒則凝。得溫則行。見黑則止。常隨氣行。氣和則血循經。氣逆則血越絡。上溢之血。火乘之。實氣逆之也。故治血宜調氣。不宜降火。猛進苦寒。以寒能凝滯。且易傷脾。若脾傷。則愈不能統攝諸血。以歸經矣。入手須辨陰陽。陽症吐衄。血色鮮紅。陰症。血色紫暗。如猪肝。陽症。脈洪滑。口渴面紅。喘煩溺。

赤火載血升。宜清降涼劑。陰症脉虛數。口乾頰赤。煩躁足冷。乃真陽失守。無根之火上炎。宜引火歸元。切忌寒涼降火。治血前後調理。須按三經用藥。宜歸脾湯。蓋心主血。肝藏血。脾統血。此方乃三經主劑也。遠志補肝以生心火。扶神龍眼補心以生脾土。參耆補脾以固肺金。木香先入脾。總欲使血歸於脾。故名歸脾湯。有鬱怒傷肝。思慮傷脾者。尤宜如火旺加黑梔。火衰加桂。再以入味地黃丸。培先天根本。治得其要矣。

凡血症見咳嗽喘滿。及膈左右脹痛者。病在肺也。宜清降。不宜升浮。如臍中一絲牽痛。或懊惱錯雜者。病在心胞也。宜養營。不宜耗散。如腹膨不飢。食不知味。吐涎沫者。病在脾也。宜溫中。不宜酸寒。

如脇肋牽痛躁擾不安。往來寒熱者。病在肝也。宜甘緩。宜疏利。不

宜秘滯。如氣短似喘。咽痛聲啞。骨蒸盜汗者。病在腎也。宜滋陰。壯

水。不宜香燥。如嘔吐煩渴。大熱不得臥者。病在胃也。補瀉當察兼

症。勿謂陽明盡可攻也。至用藥有君臣。或揣用兼用。當知其類。如

治血虛。甘溫為主。宜人乳鹿膠阿膠熟地。杞子炙草龍眼紅棗。甘酸為佐。山藥茯苓棗仁山黃五味。

牛膝白芍。又如天真丸海參膠烏骨。血虛熱。當涼潤。生地麥冬。

雞丸河車膏。燕窩飲皆血肉有情補法。血虛寒。宜辛熱。桂心炮薑杜仲沈香。氣逆血升。

小麥沙參玉竹。藕汁茅根童便。血虛寒。宜辛熱。必火不歸元者用之。氣逆血升。

宜苦降。山梔丹皮赤芍枳殼杏仁蘇子鬱金。血熱妄行。宜鹹寒苦寒。犀角元參三鮮生地黃。

連黃芩。知母。血虛而滯。宜辛甘以和之。桂枝當歸橘皮丹參。血滯而

母青黛。血虛而滯。宜辛甘以和之。桂枝當歸橘皮丹參。血滯而

痛。宜辛溫以行之。莖汁當歸鬚延胡鬱金。血陷下。宜辛苦香以舉

之。白芷、川芎、升麻、血滑脫。宜酸。潛以收之。花蕊石、續斷、白芨、蓮房、地榆、百

氣虛血脫。宜溫補以攝之。人參、黃耆、白朮、炙甘草、血枯經閉。宜鹹溫以通之。烏

魚骨、蘆茹、牛膝、肉蓯蓉。血瘀而結。宜苦瀉之。酸泄之。大黃、桃仁、三稜、蘇木、紅

血積而堅。宜鹹寒以軟之。元明粉、牡蠣、青礬、旋覆花、秋石、鯢鱈甲、血燥。宜甘潤以滑

之。乳酪、蜂蜜、黃明膠、核桃肉、柏子仁、雞蛋黃、麻仁、芝麻、其風淫襲血散之。防風、炒荊芥、溫邪

嗜血清之。甘蔗、甜梨、石斛、銀花、露、天冬、象貝母、暑喝嗽血涼之。杏仁、扁豆、沙參、竹

熱迫血瀉之。石膏、花粉、連翹、犀角、龍膽草、梔心、地骨皮、生地、丹皮、重傷。此用藥類例也。

凡口鼻出血。皆陽盛陰衰。有升無降。血隨氣上。越出上竅。法當補

陰抑陽。氣降血自歸經矣。然有陽氣本虛。復為寒涼所傷。致脈沈

而不浮。尺小於寸。右弱於左。色天而血黯。宜生脈散加肉桂、熟附、炙甘草。繼以中

湯八間服。若果受寒氣。食冷物。血得寒則凝。不歸經絡。色必黑黯。脉必沈遲。身必清涼。若此者。不用薑桂。而用涼血之劑。殆矣。

吐血論治 衄血 嗽血 咯血 唾血 嘔血附

吐血陽亢陰虛症也。症有三因。外因。係火風暑燥之邪。內因。係肝腎心脾之損。不內外因。係墜跌努力烟酒之傷。外因者。火灼風溫之。陰血暑療燥。欬之傷血。邪在肺。衛心營。理肺衛。宜甘涼肅降。如參麥冬。貝母。花。粉。玉竹。石斛。治心營。宜輕清滋養。如生地。元參。丹參。以此二法為宗。隨症加減。火灼則加入苦寒。如山梔。黃芩。知母。地骨皮。風溫則參以甘涼。如蔗汁。蘆根。暑療入營。則兼清潤。如杏仁。銀花。鮮地。黃犀角。燥欬在氣。則佐純。如羊角。桑葉。別有內熱外寒吐血者。宜麻黃參。芍湯主之。此治客感吐血大。

暑也。內因者。怒動肝火。宜苦辛降氣。如蘇子。鬱金。降香。丹。鬱損肝

陽。宜六。鬱損肝陰。宜甘酸熄風。如阿膠。雞蛋黃。思傷心脾。宜甘溫。

益營。如保元湯。房勞傷腎。其陰虛失納者。宜壯水鎮陽。青鉛六味。

牛膝。陽虛不攝者。宜導火歸竅。肉桂七味。奪精亡血者。急固真元。

大填精血。如人參。海參。熟地。河車。此治內損吐血。大暑也不內外。

因者墜跌血瘀上泛。先須導下。復元活血湯。代抵當。再用通補。元。

四物湯。或當歸。鬱。金。牛膝。白芍。三七。若努力傷血。調補忌用凝滯。宜和營通絡。理虛。

當歸建中湯。旋覆花湯。若烟酒傷肺。烟辛泄肺。酒熱戕倉血。改定。

或六味飲。加牛膝。杜仲。若烟酒傷肺。胃皆能助火動血。紫苑。

茸湯去。飲多傷胃失血。六君湯加。此治不內外因大暑也。川指南。

序。凡血來如潮湧。喘息未定。飲還元。吐血乍止。用燕窩。米糖各。

水立定。四錢煎服七日。

可不復發。血出汪洋。不即凝者。煩勞動胃火也。犀角地黃湯加桃仁藕片童便。

出散漫不聚者。煩勞傷肺氣也。補中益氣湯去柴胡加麥味茯苓山藥。脇痛吐血者。

肝氣逆也。化肝煎。神勞吐血者。心氣損也。天冬。龍欲升則吐。鯁驟加。

宜潛陰火。海參淡菜龜甲心茯苓熟地五味子熬膏秋石湯下。元海空則行動喘促。速固根。

帶。人參核桃坎炁杞子牛膝。胃納少則中宮乏鎮。須扶胃陽。切勿。

清嗽。人參建中湯。胃絡虛則厥陽易犯。急調胃陰。可免升逆。生脈散。

白扁豆沙參玉竹石斛扶神。或。仁齋所謂血症經久。多以胃藥收。

功也。若夫肺痿吐血。人參固本膏。勞怯吐血。四陰煎。血虛發熱。當歸補血湯。

虛發瘰。十全大補湯。脾肺氣虛。養營湯。絡脉不和。當歸髮雞血藤膏。牛膝降香鬱金韭白汁。血。

色鮮紫吐後神疲。懶言以補氣藥攝之。獨參湯。血色晦淡。息微脉緩。

爲血寒不得歸經以辛甘溫攝之

大劑理中湯

尺脉虛弦

大劑生料六味丸加肉桂

其勞心動火口津乾能食脉洪數

元霜紫雪膏

數吐血兩口不渴不發

熱數月又發胸中刺痛

小烏沈湯送黑神散

吐後胸滿痛脉洪大有力

用當歸丹

皮酒大黃元明粉桃仁延胡

從大便導之不可驟用止瀉不可端行膩補不可

輕用苦寒不可妄事攻伐審症切脉以調之勿拘成法可耳

繆仲淳曰吐血有三訣宜行血不宜止血血不循經絡者氣逆上

壅也行血令循經絡不止自止止之則血凝血凝必發熱胸脇痛

病日痼矣宜補肝不宜伐肝經云五臟者藏精氣而不瀉者也肝

主藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平而血有所歸伐肝則

肝虛不能藏血愈不止矣宜降氣不宜降火氣有餘便是火氣降

則火降。火降則氣不上升。血隨氣行。無溢。出上竅之患。且降火必寒涼之劑。反傷胃氣。胃氣傷則脾不能統血。血愈不能歸經矣。

欬因欬見血。係火乘肺金。乾欬絡傷。而血滲出也。治同嗽血。

嗽因嗽時氣急喘促。痰雜血絲。血點。亦火傷血膜。而血隨痰出也。

諸家以欬嗽血。出於肺。景岳謂欬嗽咯唾諸血。皆源於腎。以腎

脈貫膈入肺。循喉。肺腎相聯。因腎水虧。則火炎燥金。肺燥絡損。

液涸。成痰病之標在肺。其本固由腎也。治主壯水清金。宜六味

冬五兼潤肺止嗽。宜阿膠貝母血止後胃虛食少。氣息不續。勞劫

散去半夏加紫苑其先嗽痰。後見紅者。為積痰生熱。宜降痰火。

其及瓊玉膏等以栝蒌貝母山梔橘。先見紅。後嗽痰者。為陰虛火動。宜滋化源。

六味阿膠飲。陰虛久嗽。痰中血。星如珠。生料六味丸。加茜。久嗽痰帶。

血絲如縷。六味丸加蛤粉。阿膠。童便。臨臥服。嗽血潮熱。八珍湯加。貝母。五味。嗽血成勞。肌

削神疲。五心煩熱。咽乾。頰赤。盜汗。減食。人參飲子。或四君湯。加黃耆。龜甲。麥冬。五味。

天士先生曰。凡欬血之脉。右堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。

宜薄味調養胃陰。如生扁豆。茯苓。北沙參。薏苡仁。石斛等。左堅者。乃肝腎陰傷所

致。宜地黃。阿膠。脉弦脇痛者。宜蘇子。桃仁。成益。盈枕者。葛可久。

散。仲景大黃一症。而縷析條分。從此再加分別。則臨症有據矣。

黃連。瀉心湯。

石頑老人曰。欬血之脉。微弱平緩。易治。弦數急實。氣促聲嘶。咽

痛者。不治。

咯不嗽而喉中咯出小血塊。或血點是也。症最重。由房勞傷腎火

載血升咯血成塊。不比欬嗽痰中帶出也。亦有兼痰咯出者。係

腎虛痰泛。初起用白芍丹皮茯苓薏仁山藥山梔麥冬童便以清手足少陽厥陰諸

經遊火。若膈熱頰紅。咽喉不清。清咽太後必滋補腎陰以安其

血。六味飲加牛膝麥冬五味。景岳以為心不主血。宜養心湯嘉言以為陰氣上奔。

宜四君湯黃耆脾中陽氣旺而龍雷之火潛伏也。

血唾鮮血隨唾而出。或涎中有血。纏如絲。散如點者。多源於腎。右尺

虛者。都氣丸右尺大者。清唾湯其有兼心胃者。由脾虛不能攝也。

兼心則加味歸脾湯兼胃則七珍散食少痰清者。異功散加批杷葉扁豆勞嗽唾

血者。黃耆散肺痿唾血者。人參平肺散

嘔血。血從脘脇嘔出。係木火乘胃所致。良由暴怒火逆。胸滿脇痛。傷

肝動血。柴胡疏肝散。或負重努力傷胃動血。是齋白朮散。或飲酒火熱上
升嘔血。葛黃散。或房勞竭力傷腎嘔血。症必面紅足冷煩躁口渴。生脉散合加減八味丸。
或虛勞火升嘔血不止。花蕊石散。

血症脉候

失血脉數大爲陽盛。濇細爲血少。細數爲陰火鬱於血中。芤爲失
血。弦緊脇痛爲瘀結。寸大尺微爲肺中伏火。尺盛而寸虛爲腎虛
陰火。尺滑而疾爲血虛有熱。右脉虛大爲脾胃火。左脉數盛爲肝
膽火。失血脉微弱細小和緩者易治。洪數實大弦急或雖小按之
如循及及衄血身熱脉至而搏嘔血胸滿引背脉小而疾皆不治。
欬出白血似肉似肺淺紅色者死。喘欬失血氣逆脉見弦緊細數。

有熱不得卧者死。吐衄血脈細弱者生。實大者死。

附方

歸脾湯 見本卷勞瘵

生脉散 參 麥 五味

理中湯 參 朮 薑 草

六味七味八味丸 俱見一卷中風 六味丸加五味名都氣丸

麻黃人參芍藥湯 麻 桂 參 耆 歸 芍 麥 味 草

保元湯 見一卷火

青鉛六味飲 六味湯加青鉛

復元活血湯 柴胡 當歸 花粉 甲片 紅花 桃仁 大黃 甘草

心脾益肺虛寒補腎熱寒補氣壯水導下

吐血

攻代抵當湯大黃 歸尾 生地 甲片 元明粉 桂

通元戎四物湯地 芍 歸 芎 加桃仁 紅花

補和當歸建中湯見一卷傷風 加人參名人參建中湯

營旋覆花湯見本卷痰飲

絡紫苑茸湯紫苑茸 白朮 澤泄 丹皮 麥冬 犀角

酒犀角地黃湯見一卷溫

火補中益氣湯見一卷中風

肺化肝煎青 陳 芍 貝各二錢 丹 梔 澤各錢半

逆天冬湯參 耆 歸 芍 地 草 二冬 遠志 阿膠

心歸耆異功散參 苓 朮 草 陳 歸 耆

氣胃

腸

胃陰肺痿勞怯血虛血虛氣虛津潤

金匱麥門冬湯 見一卷燥

人參固本丸 見一卷中風

四陰煎 見本卷痰飲

當歸補血湯 者一兩 歸二錢

十全大補湯 見一卷中風

養營湯 見本卷勞瘵

元霜紫雪膏 雪梨六十枚 藕汁十杯 生地汁十杯 麥冬汁五杯 萊菔汁五杯 茅根汁十杯 合

煎去渣入煉蜜一觔 飴糖八兩 柿霜八兩

小烏沈湯 童便製香附三錢 烏藥錢半 炙草一錢 沈香五分 磨汁 加入鹽一字

黑神散 熟地 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 炮薑 甘草 黑豆炒去皮 童便 酒各半煎

嗽血

虛勞 乾咳 降痰 陰虛 潮熱 勞嗽 止血 逐瘀 咽火 補心

却勞散

見本卷乾嗽

瓊玉膏

見一卷燥

天門冬丸

天冬一兩 蜜丸

阿膠

茯苓

杏仁

貝母各五錢

六味阿膠飲

六味丸加

阿膠

八珍湯

見一卷中風

人參飲子

人參二錢 錢半

甘草一錢

五味二拾粒

耆

麥

歸

芍客

花蕊石散

花蕊石煅研細三錢 酒一半

女用醋一半和

以童便煎溫調下

男用

大黃黃連瀉心湯

大黃

黃連

清咽太平丸

薄荷十兩 草各二兩

川芎

防風

犀角

柿霜

甘

養心湯

見本卷勞瘵

桔梗三兩

蜜丸

傷酒傷胃嘔怒痿肺唾勞虛胃血唾

清唾湯

二母

桔梗

元參

黃蘗

熟地

天冬

連志

七珍散

麥冬各一錢

參

苓

朮

草

耆

山藥

粟米

黃耆散

炙者

糯米炒

阿膠

等分爲末米湯下三錢

人參平肺散

見一卷火

柴胡疏肝散

見本卷勞瘵

是齋白朮散

分參

朮

耆

苓各一錢

山藥

百合各八

葛黃散

黃連四兩

或爲末服

溫湯下

葛花三兩

用大黃末水熬成膏爲丸

類證治法

卷之二

血

四

吐血

族弟陰虛發熱吐紅脉洪虛疾左關尺爲甚思積損幾及三年龍
雷不伏直至真陰內燥肺絡受傷陰益虧陽益熾矣不從鹹降
諒難猝止用秋石阿膠熟地五味山藥百合貝母丹皮白芍淡
萊熬膏藕湯下紅止而損漸愈

毛 勞怯失血尺寸脉俱洪數乃肺腎虧損用三才湯加丹皮白
芍麥冬鮮藕數服血止惟晡熱欬嗽用六味丸去萸泄加五味
白芍龜板炙阿膠蜜丸服二料全痊

丁 痰中血點漉後遺濁五更不夢自洩此腎陰虛相火強也六
味去山萸加魚鱉炒蓮鬚兔絲餅稍佐黃蘗鹽水炒蜜丸淡鹽湯

下漸愈

韋氏晡熱嘔欬痰血此上損候也用阿膠

蛤粉炒

百合茯神鮮藕各

錢

潞參山藥白芍丹皮

各二錢

貝母

錢一

五味

分四

紅棗

五枚

二劑紅止

熱漸退去丹皮阿膠鮮藕加桔萸仁二服痰嗽亦除

旺

初夏吐紅深秋未止或主燥火刑金或主龍雷亢逆診脉右

寸短濇左關沈弦應主鬱慮不舒由氣分傷及血絡自述每午

後喉間氣窒不利則嗽作血腥夫陽主開陰主閉午後屬陽中

之陰主斂而氣隧阻閉非鬱慮內因不至此用桔梗貝母木香

桔萸茯神當歸白芍降香末服二劑脘舒血止去木香降香加

鬱金熟地二服脉平又服歸脾湯去耆朮加熟地貝母白芍蓮

子愈

錢 失血三次皆由食頃今吐紅又適當飯時自係食入氣阻胃
管滯血故咽津時腕間若噎也診脉各部俱弦宜調其逆氣兼
彌其滲絡用枯礬貝母當歸玉竹阿膠紅棗服愈後頻服牛乳
永不發

黎 立冬後陽伏地中龍潛海底今值冬至陽始生而龍已不藏
致五夜陽升灰痰帶血右尺不平此知藥八味丸症也又夙有
肝氣左脇刺痛則龍雷交戰矣初服壯水潛陽痰血已減繼服
加減歸脾湯左脇痛止灰痰亦少血絲淡而若無脉症將愈兆
也昨診惟肝脉稍弦左尺強於右是水尙能制火從此平心靜

攝戒怒節慾明春木火不至偏旺則痊平可冀熟地水丹皮酒

澤瀉鹽水炒茯苓乳蒸山藥炒遠志甘草汁炒白芍炒女貞子藕粉淡菜

牡蠣煨研煉蜜丸服

蔣氏小產後痰嗽帶血晡寒宵熱食減肌削脉小弱此病損已久

胞系不固胎墮後營衛益傷宜倣立齋先生治法以甘溫補陽

則寒熱可減近人專事杏貝希冀嗽止恐寒涼損脾反致不救

用潞參山藥茯苓炙草阿膠白芍五味杞子蓮棗數服頗安再

加黃耆鹿角霜數服諸症漸止飲食漸加又丸方調理得痊

荆氏高年食後觸怒氣升血湧洞瀉稀水身熱背寒心煩頭眩經

云怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故令氣上症由肝陽鬱勃震傷

血絡疏泄太甚木必侮土胃中水穀不化更兼暑濕司令地氣
泛潮故下迫暴注氣上故中脘失寬主以降逆佐以除滿則血
歸經而胃自和用厚樸製山梔炒鬱金磨蘇梗茯苓薏苡砂仁
降香枳壳一啜微汗前症若失

戴氏情志內損火迫絡傷嗽血晡寒宵熱脉右虛左數營損衛怯
先以膩潤彌絡育陰和陽待夏至陰生陽不加灼復元可望阿
膠水化生地炒麥冬各一錢茯神三錢杞子山藥甜杏仁俱炒丹皮石
斛各錢半五味焙五分六服諸症向安惟胸右微痛加白芍二錢萸皮
八分痛止

王淋症愈後遂發漏瘍必固瀉藥用早瘍醫用線藥膿管未拔

忽咯血塊左脉虛右尺搏指此龍火不潛上爲咯紅下爲漏膿
勞則淋遺溺痛非壯水制陽漏厠何已勢將由下損上爲勞嗽
爲吐衄肛漏安可平也暫服煎劑倣虎潛丸加減熟地水龜膠
淡萊白芍當歸五味杞子知母黃蘗俱酒炒六服脉症平後用煉
蜜爲丸加茯苓山藥丹皮牛膝鹽湯下漏瘍亦愈

史氏胸痛嘔血色兼紅紫頭眩腕悶脉扎微此憂思損營宜斂補
心神兼舒脾結凡離絡之血色變紫非必積瘀使然潞參茯神
白芍五味棗仁炙草當歸醋炒合歡花鬱金木香俱磨汁冲三服已安
調理尋起

衄血論治

口鼻衄 九竅衄

耳衄 血溢

眼衄 心漏

齒衄 脾血附

舌衄

肌衄

血從清道出於鼻為衄症多火迫血逆亦有因陽虛致衄者火亢

則治宜清降

生地黃飲 子茜根散

陽虛則治宜溫攝

理中湯 黑神散

既於脉之洪滑

弦細別之暴衄則治須涼瀉

犀角地黃湯 七汁飲

久衄則治須滋養

止衄散 生脉散

更以血色之鮮濃暗淡辨之且火迫致衄有六淫之火有五志之

火如風寒壅盛於經迫而妄行表症仍在脉浮

緊

用麻黃湯 桂枝湯

成氏

謂此非治衄仍以散邪仲景固言衄不可汗也若感溫熱風暑而

衄者宜辛潤清涼

如杏仁 丹皮 山梔 茅花 丹參 鮮地黃 因火邪亢 連翹 石斛 犀角 麥冬 阿膠 蔗汁 藕汁

極而衄者宜苦寒鹹寒

如黃連 黃芩 山梔 枳殼 枯蘗 元參 犀角 童便

此治衄外因也其

思傷心脾驚悸不眠

歸脾湯

勞傷元氣欬嗽發熱

補中益氣湯 去白朮 加麥冬 五味 或

當歸補血湯。怒傷肝陰。火冒頭暈。生地、丹皮、白芍、山梔。慾傷腎精。

陰虛失納。上喘下遺。都氣丸、加杞。若火不歸源。喘促煩躁。脉微肢

厥。八味地黃、陰虛陽浮、六味飲、加秋石、衛虛營損、氣短色枯、養營

氣衰血脫。神疲昏憤。獨參湯。胃火血升。犀角地黃、此治衄內因也。其

酒升血沸。面赤汗多。四生努力負重。傷中損絡。保元湯、此治衄不

內外因也。若衄多。服涼劑不止。係內虛寒。而外假熱。千金當歸湯。衄久

不止。熱在下焦血分。六味飲、加衄久成勞。照虛損治病後小勞。屢

衄。石膏牡蠣湯。衄後屢發。或洗面即衄。並以茅花煎湯。衄血未淨。停瘀

入胃。致面黃屎黑。加味犀角地黃湯。大衄而頭痛口渴。玉女煎。大衄不止。面

目浮腫。蘇子降氣湯。使血隨氣下。得力全在肉桂。凡久衄。須加氣藥。如木香、黑

香附。所以引血歸經耳。

口鼻。血出口鼻屬肺脾二經。積勞傷脾。補中益氣湯倍者歸。如不應歸脾湯加藕節童便。

耳。血出耳竅屬肝腎二經。暴聾腫痛左關弦數多肝經風火沸騰。

柴胡清肝散。若常有點血不腫痛尺中沈數多腎經陰虛火升。生料

丸加五味元參外用龍骨煨研吹入即止。

眼。血出目眦屬肝火迫絡損系。若猝視無親。滋陰地黃丸去柴胡常流血淚。

駐景丸外以炒黑槐花末研敷眼角。

齒。血出齒縫牙齦屬胃腎二經。陽明入下齒。少陰入上齒。陽明火盛必口臭牙

齦腐腫。甘露飲。或血湧齒不搖必酒食炙煨積熱。清胃散外敷冰玉散甚則

衄不止大便秘。調胃承氣湯。陽明風壅齒齦微腫或牽引作痛。消風散加

犀角連翹外搽。少陰虛口不臭齒浮動不痛牙縫中衄點滴而

出。係腎陰不固虛火偶動。大味飲加。若隱隱作痛係陽虛於下。

火炎於上。七味地黃丸。或鹽湯下安。齧底成塊血出。鹽湯下。

舌血出舌上如線。或有針孔多屬心包火。先以蒲黃煎湯漱之。內

服黃耆六一散。若舌出血如泉。塗舌丹。或川

乾薑灰生蒲。黃為末。搽。舌脹大出血不止。

肌血出膚孔屬衛氣不固。血乘陽分。脉洪。當歸六。脉弱。保元。脉數。

當歸補。脉浮。黃耆建。有紅汗色紅染衣。黃耆建中湯兼用妙。

九竅諸竅齊衄。總治。犀角湯。有中。毒者。飲生。頭撲傷者。灌熱。煩勞。

傷者。補中益氣。若五臟內崩者不治。有偏體無故血出。五花。

血從上出。隨火妄行。原病式以為心火銷燬。用黃連或偶觸破

傷血湧不止。

內服十全大補湯。外用百草霜摻之。

心胸前一孔出血。水名心漏。

用嫩鹿茸去毛酥炙。附子炮去皮。麝和鹽花共研末。以棗肉杵丸。酒下。

血出臍中。胃受火逼。不得運輸。

宜熟地當歸白芍丹皮甘草白芷側柏葉茅根汁藕汁之屬。

衄血脉候

衄而不止。脉大者逆。

靈樞

脉至而搏。血衄身熱者死。

素問

病若吐衄。脉

當沈細反浮大而牢者死。

難經

脉得諸瀉濡弱為亡血。

經脉

浮大數

為邪伏於經。宜發汗大而虛為脾虛不能統血。宜補氣小而數為

陰虛火乘。宜滋腎。弦瀉為痰積。宜行滯。凡衄血之脉。數實堅勁。或

急疾不調。皆難治。久衄脉虛大。頭額痛。鼻流淡黃水者死。

附方

清

生地黃飲子

生地

熟地 杞子

阿膠

白芍

茯苓

清

茜根散

茜根 阿膠

黃芩

側柏葉

生地各一兩

廿

草五錢

溫

理中湯

見一卷中風

攝

黑神散

見本卷血

涼

犀角地黃湯

見一卷溫

涼

七汁飲

韭汁

藕汁

鮮荷葉汁

京墨汁

側柏葉汁

生地汁

童便各一杯和勻服

滋

止衄散

黃耆六錢

當歸

赤苓

白芍

生地

阿膠各

三錢

為末麥冬湯調服

益

生脉散

參

麥

五味

肺

麻黃湯

麻

杏

桂

草

寒

風寒傷脾氣虛血喘逆補火補火陰虛調營酒沸

桂枝湯 桂 芍 草 薑 棗

歸脾湯 見本卷勞瘵

補中益氣湯 見一卷中風

當歸補血湯 炙耆一兩 當歸二錢

都氣丸 見一卷火

八味丸 見一卷中風

鎮陰煎 熟地一兩 牛膝二錢 澤泄一錢五分 炙草

六味丸 桂心各一錢 製附子七分 水煎冷服

養營湯 見本卷勞瘵

四生丸 生艾葉 生荷葉 生側柏葉 生地黃 搗丸如

雞子大水煎去渣服

傷中虛寒病後停痰降火降氣治外

保元湯

見一卷火

千金當歸湯

當歸一錢 各一錢半

炮薑五分

白芍

阿膠

黃芩

石膏牡蠣湯

石膏五錢

牡蠣一兩

研末酒服日三次

加味犀角地黃湯

地黃 芍草

丹犀角 再加

歸枯

玉女煎

見一卷溫

蘇子降氣湯

見本卷失音

單方

以大蒜頭搗如泥作餅如錢大貼足心左側貼右右側貼左兩孔俱貼左右俱貼即止

單方

用線紫中指中節左孔貼紫左中指右孔貼紫右中指兩孔俱貼兩指俱紫

單方

黑山梔 煅牡蠣 煅龍骨 京墨 百草霜 血餘 灰 等分爲末 用茅花水煎藥末入鼻孔立止

單方

用濕紙搭額上立止

耳 眼 眼 眼 齒 齒 齒 外 敷 便 秘 風 腫 腎 虛 陽 虛

柴胡清肝散

小柴胡湯去半夏棗薑 加梔子 川芎

滋陰地黃丸

二地 芩 連 參 草 歸 味 柴 枳 天冬 地骨皮 蜜丸茶下

駐景丸

杞子 車前子 各二兩 熟地五兩 兔絲子八兩 蜜丸酒下

甘露飲

二地 二冬 石斛 茵陳 黃芩 枳壳 枇杷 葉 甘草

清胃散

生地四錢 升麻錢半 丹皮五錢 當歸 川連 各三錢 爲末分三服

冰玉散

冰片五分 硼砂 元明粉各五錢 辰砂六分

調胃承氣湯

大黃 芒硝 炙草

消風散

見本卷失音

七味丸

六味加桂心

安腎丸

便製香附二兩 炮川烏 川椒各一兩 青鹽炒 小茴香三兩 熟地四兩 川楝子三錢 酒糊丸

舌

黃耆六一散

黃耆六兩

甘草一兩

舌

塗舌丹

烏賊骨

蒲黃

等分

研末塗舌上

肌

當歸六黃湯

當歸

黃耆

生地

熟地各一錢

黃芩

肌

黃耆建中湯

黃耆

桂

芍

草

薑

棗

飴糖

汗

妙香散

山藥二兩

人參

黃耆

遠志

茯苓

茯神各一兩

一錢

辰砂二錢

側柏散

側柏葉蒸乾二兩半

荆芥炭

人參各一兩

每

犀角湯

犀角汁

黃連

荆芥炭

小蘗各一錢

生龍骨

五花湯

水蘆花

紅蓼花

槐花

茅花

白雞冠花

黃連瀉心湯

大黃

黃連

血

身

偏

九

九

溢血

十全大補湯

見一卷中風

衄血

族子勞力傷陰口乾鼻衄頰赤神疲是冬陽不潛當春脉洪晡熱
係引動溫邪先治溫後治勞黑山梔生地白芍丹皮麥冬沙參
元參蔗汁三服脉洪已退鼻衄亦止而右尺不靜龍燄未熄宜
滋陰潛陽六味丸料去澤泄加龜板淡菜五味白芍煎服十劑
效

蕭 去秋陰瘧病延今夏三日兩發熱重寒輕鼻衄左孔膝脛熱
蒸乃腎陰下虧膽火上冒仍用柴防升動致汗多渴眩鼻衄不
已皆誤藥貽咎生地丹皮山梔知母酒炒牛膝酒蒸白芍烏梅桑葉
三四服病已嗣此多服六味丸以滋下元

呂氏暑熱煩勞下崩上衄屢次暈絕肢冷胸溫甦醒後脇滿心忡
驚汗不寐脉虛芤此心肝血失所統而氣隨血脫也急須固氣
以攝血乃陰從陽長之理用洋參五錢扶神三錢棗仁各二錢龍骨各二錢
甘草錢半龍眼五枚小麥二合五味八分三劑神安熱麻逾日血仍至復
暈而甦用理中湯加荊芥醋炒數服得止

王 春初鼻衄口乾惡熱由努力傷絡血凝氣聚臍左板硬如掌
腕痞不容側卧脉左大右小肝乘絡傷應地氣上騰直犯清道
先進緩肝降逆俟衄止再商理痰黑山梔鬱金萸仁白芍阿膠
水當歸醋炒麥冬丹皮炙草一啜甚適三服衄止脉左斂原方去
芍膠歸草加牡蠣降香牛膝歸鬚桃仁二服便下瘀黑腕腹俱

寬蓋血以下行爲順上行爲逆故降逆佐甘緩理於佐軟堅

宗 面蒼赤體質陰虛病後微熱牙齦血衄成塊隨咽下不痛不

腫治用滋腎以潛龍火熟地

水

黃蘗

酒

茯苓丹皮牛膝

蒸

煎湯

冲真藕粉二服外用青鹽青黛石膏研細敷齒齦不日而衄止

王 當春大衄由情志拂逆膽火上迫致血直犯清道昏眩不時

速用清降以遏少陽升逆之威羚羊角黑山梔丹皮阿膠生地

鮮桑葉二服衄止脉來小瀉模糊胸際隱痛晡時足腫由傭作

傷陽元氣不振懼其過勞輒發法宜和補脾陽潞參白朮炙草

扶神白芍當歸

醋炒

鬱金

汁

數服愈

汗症論治

汗爲心液。腎主五液。故汗出皆出心腎虛致之。有自汗。有盜汗。自汗屬陽虛。盜汗屬陰虛。自汗者。不因勞動。不因發散。漚然自出。由陽虛不能衛外而固密也。盜汗者。寐中竊出。醒後倏收。由陰虛不能內營而斂藏也。陽虛自汗。治宜補氣以衛外。陰虛盜汗。治宜補陰以營內。固衛則表氣實而腠理不疏。填營則裏真固而陰液不洩。條其治法。表虛自汗。失斂。補陽湯裏虛盜汗。有熱。益陰湯表裏不固。汗出。黃耆湯氣虛而陽弱者。必自汗。者附湯凡陰虛而火蒸者。多盜汗。當歸地黃湯陽虛者。陰必乘。多發厥。自汗。黃耆建中湯陰虛者。陽必湊。多發熱。盜汗。當歸六黃湯陽蒸陰分。則此從乎表裏陰血熱。血熱則液泄爲盜汗。

陽為治也。然自汗有屬腑臟者。經云飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪。

精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。搖體勞苦。

汗出於脾。如胃熱。食則汗出如洗。二甘湯或飲酒漏風。汗出如浴。

白朮散。肺虛。痿易疏泄。玉屏心虛。神不安謚。殊砂安神丸腎虛。元府

不閉。六味丸肝脾虛。精血久耗。三陰士材亦云。肺虛者固其皮毛。

黃耆六心虛者益其血脈。當歸六腎虛者助其封藏。五味脾虛者

壯其中氣。補中益肝虛者禁其疏泄。白芍此從乎腑臟為治也。其

盜汗乃睡中自泄。參苓水火不交。心腎陰陽偏勝。黃耆虛損心惕。

柏子仁湯至如病後氣血俱虛。自汗。十全大產後血脫。孤陽無依。

牡蠣散。大。汗不止。獨參。凡津脫者。汗大泄。大補元煎。痰盛者。汗自流。理中

湯。去杜仲。

湯。發汗過劑。血虛成痙。防風當歸湯。汗多亡陽。身冷拘急。桂枝加附子湯。若夫

風濕相搏。時自汗出。防已黃耆湯。惡風自汗。桂枝湯。傷寒陽明少陽症盜

汗。柴胡湯。葛根湯。選用。溫熱症三陽合病。目合則汗。白虎湯。額汗濕熱上蒸。或

血畜胃口。迫其津液。致之畜血。頭汗劑頸而還。犀角地黃湯。頭汗小便

不利。渴而不飲。此血瘀膀胱也。桃仁承氣湯。胃熱上蒸。額汗發黃。小水

不利者。五苓散。加茵陳。甚則茵陳蒿湯。利之。傷寒脇痛耳聾寒熱口苦。頭汗劑頸而

還。屬少陽。小柴胡湯。加桂枝。茯苓。白朮。和之。少陽挾熱。或為盜汗。或腋汗脇汗。須

知從陰陽交互時。及陰陽交互處發泄者。皆陰陽不和。半表半裏

症。小柴胡湯。皆合劑也。外有頭汗。頭者。諸陽之會。邪搏諸陽。津液上奏。則頭汗。齊頸而

還。屬血症。四物湯。濕邪搏陽。亦汗出頭額。參用勝濕湯。調衛湯。水結胸無大熱。

亦汗出頭額

小半夏加茯苓湯

陽明胃實亦汗出頭額

調胃承氣湯

胃腑熱蒸

手足自汗亦陽明病當下

大柴胡湯心液盜汗久不止

參歸

當心一片

津津自汗名心汗

補心丹

陰囊汗為腎虛有濕

安腎丸

主之兩腋汗腳

心肝為濕熱流注

牡蠣丹

主之有血汗因膽經熱血妄行與少陰氣

併奪命散

產後血汗

獨皮湯

有黃汗因汗出浴水濕熱內鬱

耆陳湯

一切

汗出不止外治法

紅粉散

惟珠汗不流汗出如油額汗如雨喘促肢

冷皆陽脫不治

經曰陽有餘為身熱無汗陰有餘為多汗身寒又曰血與汗異名

而同類故奪血者無汗奪汗者無血註云奪者迫之使出也又曰

腎病者寢汗憎風寢汗即盜汗也

東垣曰凡內傷自汗。補中益氣湯稍加附子。麻黃根浮小麥。其效如神。但升少用兼

蜜炙以抑其升發暴悍之性。又欲其引參耆等味達肌表也。

凡服止汗固表藥。不應愈。斂愈出者。只理心血。以汗乃心液。心不

攝血。故溢為汗。大補黃耆湯加棗仁。微熱者加右當心汗為思慮傷脾。補心丹。

凡久病不愈。必氣血兩虛。自汗熱不退。補中益氣湯加川附。或用歸脾湯。如便燥

自汗熱不退。屬陰血。六味地黃湯加生脉散。如病陽虛熱極。自汗而解。汗後

又熱。汗出如水。此陽被汗散發泄在外。而不歸元。保元湯加浮麥。牡蠣或炒焦棉。

子煎如心神不安者。加安神丸。凡虛陽上攻。必求下達。保元湯加木瓜。使陽氣回元。

凡汗症有陰陽。陽汗者熱汗也。陰汗者冷汗也。汗之冷者。以其陽

氣內虛。陰中無陽。而汗隨氣泄。凡大驚恐及病後產後失血後多

有汗出。是皆陽氣消耗。真元失守候也。故經曰。陰勝則身寒。汗出

又曰。極寒反汗。出身必冷如冰。是皆陰汗之謂。治必扶其正氣。其

汗乃止。若虛甚者。非速救真元不可。薑桂附子之屬。必所當用。

凡病不當汗而誤汗。或當汗而汗之過劑者。皆汗多亡陽之症。是

亦陰症之屬。當察其虛之或微。或甚微。虛者。三陰煎。或五陰煎。獨參湯之類。虛甚

者。非用。大補元煎。六味回陽飲之類。不可。凡衛虛不固。腠理不密。而易汗者。是

亦陰症之屬。宜黃芪六一湯。或者附湯。已上四段。本景岳全書。

醫通曰。病後氣血俱虛。而汗服諸止汗藥。不應。用十全大補湯半

劑。加熟棗仁五錢。若胸臆煩悶。不能勝陰藥者。生脉散加黃耆二

錢。當歸六分。熟棗仁三錢。一服即驗。夏月汗止。半身由氣血不

充內挾寒飲偏枯及天之兆也。用大劑十全大補湯人參養營湯大建中湯。加行經防已。熱痰藥治之。若元氣稍充。卽間用小續命湯一劑。以開發其表。或黃耆湯加川烏以散其濕。此症雖屬血虛。不可用四物。以其閉滯經絡故也。丹溪曰。自汗大忌生薑。以其開腠理也。凡有汗一切辛辣之味。五辛之屬均忌之。

汗症脉候

寸微尺緊。虛損多汗。肺脉爽而散者。病瀆汗。平人脉虛微細者。盜汗。出自汗在寸。盜汗在尺。脉盛汗出。病不衰者。死。汗出而脉脫者。不治。

附方

風酒汗胃汗胃汗盜汗自虛陰虛陽裏表虛裏虛表

補陽湯 參 耆 朮 草 五味 虛加附子

益陰湯 黃 地 丹 芍 麥 味 山藥 澤瀉 燈草

黃耆湯 耆 地 茯苓 天冬 麻黃根 肉桂 龍骨各 一錢 麥 味 防風各八分 歸 草各七分

耆附湯 耆 附各二錢 薑十片

當歸地黃湯 歸 芍 苓 朮 耆 葉 陳 草 人參 熟地 生地 知母 浮麥 棗

黃耆建中湯 見本卷 鯽血

當歸六黃湯 見本卷 鯽血

二甘湯 生甘草 炙甘草 五味 烏梅 薑 棗

牡白散 煨牡蠣 白朮 防風各二錢

白朮散 白朮一兩二錢五分 防風一兩五錢 牡蠣三錢

衛虛心汗心火腎汗補腎肝脾肺汗腎汗脾汗肝汗

玉屏風散

見一卷中風

硃砂安神丸

黃連五錢 炙草

錢半 硃砂一錢半

生地各三錢半

當歸二

天王補心丹

見一卷火

六味丸

見一卷中風

還少丹

見一卷中風

三陰煎

歸

地

參

耆

芍

味

草

棗仁

黃耆六一湯

耆六錢

草一兩

煎服

五味子湯

五味

山萸

龍骨

牡蠣

何首烏

遠志

補中益氣湯

見一卷中風

白芍湯

白芍

棗仁

烏梅

盜汗

參苓散

參 苓 棗仁

心腎

心腎丸

子 參 耆 歸 地 苓 味 牛膝 菴蓉 兔絲

惕心

柏子仁湯

柏子仁 麻黃根 半夏 麴各二兩 牡蠣 人參 白朮

斂汗

牡蠣散

黃耆 麻黃根 牡蠣 小麥

病後

十全大補湯

見一卷中風

津脫

大補元煎

見一卷中風

痰汗

理中降痰湯

參 朮 薑 草名理中湯 此加苓 夏

瘧汗

防風當歸湯

芍 歸 防 地

亡陽

桂枝加附子湯

桂 芍 草 薑 棗 名桂枝湯 此加

濕風

防已黃耆湯

見一卷濕

少陽 少陽 三陽 陽 畜血 血 瘀 胃 熱 發 黃 陰 陽 濕 邪 理 濕

小柴胡湯 見一卷溫

葛根湯 葛根 麻黃 薑 桂 芍 草 棗

白虎湯 見一卷中風

犀角地黄湯 見一卷溫

桃仁承氣湯 見一卷疫

五苓散 見一卷溫

茵陳蒿湯 見一卷濕

逍遙湯 見一卷火

勝濕湯 茅朮 厚樸 半夏 藿香 陳皮 甘草 薑

調衛湯 麻黃根 黃耆 羌 麥 地 歸 草 苓 夏

猪苓 蘇木 紅花 五味子

汗

結胸 胃實 陽明 心汗 腎虛 外治 血汗 產血 黃汗 外治

小半夏加茯苓湯 見本卷痰飲

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草

大柴胡湯 見一卷溫

參歸腰子 人參 當歸各五錢 猪腰一个 黃 再蒸

安腎丸 蘆巴 補骨脂 川棟子 茴香 續斷各一兩半 杏仁 桃仁 山藥 茯苓各一兩

牡礬丹 牡蠣粉 黃丹各二兩 枯礬四兩 研擦

奪命散 硃砂 寒水石 麝香 等分 每服五分 又名定命散

狷皮湯 狷皮燒灰 米飲下 狷肉煮食更妙

耆陳湯 石膏 耆 芍 麥 豉 草 茵陳 薑

紅粉散 麻黃根 煨牡蠣各一兩 赤石脂 龍骨各五錢 絹包擦之

補虛 陰血 培元 補虛 偏枯 寒飲 發表

大補黃耆湯

參耆 北

草 芎 歸

黃 味 桂心

三兩

薑 棗

生脉散

見一卷暑

保元湯

見一卷火

六味回陽飲

見本卷欬嗽

人參養營湯

見本卷勞瘵

大建中湯

蜀椒

乾薑

人參

飴糖

小續命湯

見一卷中風

脫症論治

生命以陰陽爲樞紐。陰在內。陽在外。陰之使。陽互根相抱。不脫。素問所謂陰平陽秘。精神乃治也。若夫元海根微。精關直泄。上引下竭。陰陽脫離。命立傾矣。靈樞云。精脫者耳聾。氣脫者目不明。津脫者腠理開。汗大泄。液脫者骨屬屈伸不利。色天。腦髓消。脛痠耳數鳴。血脫者色白。天然不澤。其脉空虛。難經云。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。嘉言喻氏又分上脫下脫。上下俱脫。今詳斯症。總由陰陽樞紐不固。如上脫者。喘促不續。汗多亡陽。神氣亂。魂魄離。卽脫陽也。下脫者。血崩不止。大下亡陰。交合頻精大泄。卽脫陰也。上下俱脫者。類中眩仆。鼻聲鼾絕。汗出遺尿失禁。卽陰陽俱脫也。

更有內閉外脫者。痙厥神昏。產後血暈等症是也。治法在未脫之

先審其元陽欲絕者。於回陽劑中兼引陰。參附湯用重便煎。真陰欲絕者。

於攝陰劑中兼固陽。固陰煎。其心神浮越。起卧不安者。招集潰散之

陽。龍蟠救逆湯。去桂。薑。蜀漆。加參。附。棗仁。茯神。脉微垂絕。氣短汗出者。收拾虛耗之金

生脉散。或血脫者益氣。吐血不止。獨參湯。精脫者填營。縱慾走陽。人參飲子。血脫者益氣。加參三七童便。救脫湯。

魂離者鎮肝。身外有身。定魂丹。崩中者固下。血漏暴注。安崩湯。津脫者實衛。亡陽。

收汗。液脫者滋陰。血枯成痿。加喘促而吸入短者。資化源。氣急不續。都氣丹。

類中而神昏冒者。息風火。心火暴甚。河間地黃飲子。去桂附巴戟。至於內閉外脫。

如痙厥神識不醒。暫用豁痰。鮮菖蒲根汁。產後血暈未甦。急爲開

竅。外燒鐵器。淬醋熏鼻。或燒蘇合香嗅氣。凡諸暴脫。或孤陽無根。內灌清魂散。若血閉。用獨聖散。參蘇飲。

而陰失所繫。或精血驟去而神失所依。洵有如喻氏所見壯歲無病。一笑而逝。少年交合。一注而傾者。不早尋解漏而緘固之。其能拯危於一綫也哉。

附方

參附湯 參 附 薑

固陰煎 參 地 黃 味 山 藥 蓮 志 炙 草 兔 絲 餅

龍蠟救逆湯 龍 骨 四 兩 牡 蠣 五 兩 炙 草 二 兩 大 棗 十 二 枚 桂 枝 薑 蜀 漆 各 三 兩

生脉散 見一卷暑

人參飲子 見本卷血

救脫湯 人 參 三 兩 附 子 一 錢 黃 耆 三 兩 熟 地 麥 冬 各 一 兩 五 味 子 一 錢

魂虛暴注津脫液脫喘虛類中痿厥產暈血悶血悶

定魂丹

參 苓 白芥子

歸 朮 麥 丹砂 龍齒

柏子仁

棗仁 遠志

安崩湯

參 朮

者各一兩

三七根末五錢水煮

收汗丹

參 耑 當歸五錢

麥 地各一兩 甘草一錢

棗仁五錢

五味三錢

加減四斤丸

熟地 鹿茸

五味 菟絲子

茯苓

牛膝

木瓜

天麻

都氣丸

見一卷火

地黃飲子

見一卷中風

至寶丹

見一卷中風

清魂散

人參

甘草

川芎

澤蘭

荆芥

獨聖散

五靈脂半炒半生水煎服

參蘇飲

人參

蘇木

脫

堂弟心力經營煩勞動火消穀善飢坐則手足俱顫寐則手足如
墮夢則體析爲二神志恍惚呵欠氣洩右脉小弱左虛軟不受
按因操勞疲神元氣不司鎮攝若轉失氣須防暴脫食下煩餽
稍定足知中宮底柱之權急攝陽以交陰潞參茯神山藥五味
杞子白芍龍骨牡蠣俱煨研棗仁炒研三服神魂安帖諸症俱減惟
巔痛唾涎原方加嫩桑葉炒甘菊以熄肝膽風熱加益智半夏
青鹽炒以攝脾涎又數服間服膏方而安 此症因其胃旺能納
端受滋填川海參煨鴨及火腿雞蛋等皆血肉有情之品故未
及兩旬已瘥

類證治裁卷之二終